

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarih ve Numarası:

#### KULLANILACAĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	20 ml/da (Larva)	35 gün
	Tütün tripsi ( <i>Thrips tabaci</i> )	20 ml/da (Larva-Ergin)	

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

#### KALİBRASYON

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İlaçlama Makinesinin Temizliği

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

**Pamukta yeşilkurt:** 50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite kabul edilir ve yaklaşık olarak birbirine eşit üç bölüme ayrılır. Her bölümde rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

**Pamukta tütün tripsi:** Pamuk fidesi 1-3 gerçek yaprak döneminde iken zararlı popülasyonu yaprak başına 1 adet (larva veya ergin) düzeyine geldiğinde kimyasal mücadelesi yapılmalıdır.

18 Eylül 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



# Cimegra® SC

## Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	30	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

100 g/L Broflanilide

Net Miktar: 1 L E  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER  
Broflanilide

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ  
DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H351 Kanserojen etki şüphesi.  
H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.  
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.  
EUH 208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P201 Kullanmadan önce özel kullanma talimatları alın.  
P202 Güvenlikle ilgili önlemlerin tamamı okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük veya maske kullanın.  
P391 Döküntüyü bir araya toplayın.  
P405 Kilit altında muhafaza edin.  
P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Alerjik reaksiyona neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız. bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın. Maruziyet ya da etkilenme halinde, Sağlık desteği alın.

Dr. A. Sibel VELİOĞLU  
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Mersis No 0143022384900015 Sicil No 163411  
Barbaros Mah. Beğonya Sok. Hüdakale Atışlar Köyü  
C. Kızıllı No 3E 5.22 34740 Alayunt İSTANBUL  
Beyan Numarası: V.İ. 143 002 3543

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**

Cimegra® SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 30 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Cimegra® SC'nin etiketindeki zararlılara karşı aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam iki uygulama sayısını aşmayınız. Tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 30 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU**

Eğer diğer bitki koruma ürünleri ile bir karışım yapılacaksa, aynı bir kaptaki karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletmeden kullanılması tavsiye edilir.

® BASF firmasının tescilli markasıdır.



# Cimegra® SC

**Süspansiyon Konsantre (SC)**

Grubu	30	Insektisit (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

100 g/L Broflanilide

**Solunursa;** hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

**Deri ile temas ederse;** Derhal sabun ve suyla iyice yıkayın.

**Göz ile temas ederse;** etkilenen gözü, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın.

**Yutulursa;** derhal ağız su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurun.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ**

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**



**Muammer FİDAN**  
Ziraat Mühendisi

*Bağcıoğlu V.*

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Yılda en fazla dekara toplam 5 g aktif madde uygulama oranını aşmayınız.
- Suda yaşayan organizmalara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını bitki koruma ürünü ile buluşturmayınız.
- Hedef dışı arthropodlara zehirlidir. Faydalı böcekler kullanıldığında UYGULAMAYIN.
- Arılara zehirlidir. Arılar, ilaçlama esnasında doğrudan veya ilacın sürüklenmesi ile, ya da yaprağın üzerindeki veya çiçekli bitkiler ile yabancı otların polen ve nektarları üzerindeki kalıntıları yoluyla bitki koruma ürününe maruz kalabilirler. Bitkiler çiçeklenme dönemindeyken UYGULAMAYIN. Arılar tarla yüzeyinde bulunan çiçekli yabancı otlarda yiyecek arıyorken ilaçlama yapmaktan kaçınınız.

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırını dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

**ÜRETİCİ FİRMA**

BASF Agrochemical Products B.V. (PR), Puerto-Rico Branch  
Road No. 2, KM 47.3, 00674, Manati, Puerto Riko, ABD

**ÜRETİM TESİSİ**

BASF Corporation Sparks Plant, 14284 Highway 41 North, Sparks, GA, 31647, ABD

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı  
No:3e/ 5-22 Ataşehir / İstanbul  
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

*A. Sibel Velioglu*  
Dr. A. Sibel VELİOĞLU  
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Merkez No: 0142002304906015 Sicil No: 183411  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı  
No: 3E/ 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL  
Büyük Mühürler YD: 113 002 3649

18 Eylül 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR