

■ BASF

We create chemistry

QL Agri® 35 SL

Bilinçli Tercih, Güvenilir Çözüm

- QL Agri® 35 SL nematod mücadelesinde ruhsatlı %100 doğal bir üründür
- Maksimum verim ve yüksek kalite sağlar
- Kalıntı riski yok, 0 gün



QL Agri® 35 SL



Etkili Madde

350 g/L *Quillaja saponaria* ekstraktı



Karışabilirlik Durumu

QL Agri® 35 SL'in normal olarak diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.



Formülasyon

SL (Suda Çözünebilir Konsantr)

Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Kullanım dozu ve dönemi
Domates (Sera) Hıyar (Sera) Biber (Sera) Patlıcan (Sera)	Kök ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	2000 ml/da (1. ve 2. uygulamada) 1000 ml/da (3. uygulamada)
Muz (Sera)		5000 ml/da (2 uygulamada)



QL Agri 35® SL



Kontrol

QL Agri 35® SL

Etki şekli ve özellikleri



QL Agri® 35 SL, Şili'ye özgü bir ağaç olan *Quillaja saponaria* Mol. (*Quillay*)'dan elde edilmektedir.

QL Agri® 35 SL'in içeriğinde bulunan saponin ve polyphenol bileşikleri nematodların hücre zarlarında kompleks oluşturarak nematodların yaşaması için gerekli olan kolesterol sentezini durdurmakta ve nematodların ölümüne neden olmaktadır.

Nematisit etkisine ilave olarak QL Agri® 35 SL, bitkilerin kök hücrelerinin zararında geçirgenliği değiştirerek su ve bitki besin maddesi alınımını artırmakta ve bu sayede bitkilerin ısı ve kuraklık stresi, toprak kökenli hastalık ve zararlılar gibi olumsuz çevre şartlarına karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır

Bitki koruma ürününün uygulamaya hazırlanması



Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır.

Tankın deposu yarıya kadar suyla doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

Kullanma zamanı ve şekli



Serada; domates, hıyar, biber ve patlıcan kök ur nematodları:

1. uygulama: 2000 ml/da - fide dikiminden 15 gün sonra
2. uygulama: 2000 ml/da - birinci ilaçlamadan 15 gün sonra
3. uygulama: 1000 ml/da - ikinci ilaçlamadan 15 gün sonra

Serada yetiştirilen muzlarda kök ur nematodları:

1. uygulama: Nisan - Mayıs aylarında (onarım döneminde)
2. uygulama: birinci ilaçlamadan 3 ay sonra

Uygulama damlama sulama sistemiyle sulama bitimine doğru yapılmalı ve 5-10 dakika daha sulamaya devam edilmelidir.

BASF Tarım Çözümleri Türkiye Merkez

Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Cad. 377/2 Sokak No: 2 Kapı No: 94/A ve 94/B Bornova / İzmir

Detaylı Bilgi İçin:

☎ 0232 332 14 22 🌐 www.agro.basf.com.tr 📺 BASF Tarım Çözümleri 📷 BASF Tarım Çözümleri

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.

QL Agri® 35 SL = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Ürünü dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.