

ÜRÜNÜNÜZÜ

FARKLI HASTALIKLARA KARŞI

DAHA İYİ KORUR.

Kültür Bitkisi	Hastalık Adı	Kullanım Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
Elma	Elma Karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	30 g / 100 lt su	7
	Elma Küllemesi (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	40 g / 100 lt su	14
	Elma Depo Hastalıkları (<i>Penicillium spp. Botrytis cinerea, Monilinia fructigena</i>)	40 g / 100 lt su	14
Armut	Armut Karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	30 g / 100 lt su	7
	Armut Memeli pası (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)	40 g / 100 lt su	14
Ayva	Ayva Monilyası (<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	50 g / 100 lt su	14
Kayısı	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g / 100 lt su	14
Şeftali	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g / 100 lt su	14
Nektarin	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g / 100 lt su	14
Kiraz/Vişne	Meyve Monilyası (<i>Monilinia fructigena</i>)	40 g / 100 lt su	7
	Çiçek Monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)		
Antep fıstığı	Karazenk (<i>Septoria pistacina</i>)	50 g / 100 lt su	-
Nar	Kahverengi leke hastalığı (<i>Alternaria alternata</i>)	50 g / 100 lt su	-
Mandarin	Kahverengi leke hastalığı (<i>Alternaria alternata f.sp. citri</i>)	40 g / 100 lt su	7
Nohut	Nohut antraknozu (<i>Ascochyta rabiei</i>)	50 g / da	10

Bellis®

Üstün koruma!

Bahçeden tüketiciye tam sağlık!

☎ 0232 332 14 22
 🌐 www.agro.basf.com.tr
 📘 BASF Tarım Çözümleri
 📺 BASF Tarım Çözümleri

BASF Tarım Çözümleri Türkiye Merkez

Kazımdırık Mahallesi, Üniversite Cad. 377/2 Sokak No: 2 Kapı No: 94/A ve 94/B Bornova / İzmir

Detaylı Bilgi İçin:

☎ 0232 332 14 22 🌐 www.agro.basf.com.tr 📘 BASF Tarım Çözümleri 📺 BASF Tarım Çözümleri

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.


Bellis® = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Ürünü dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.


MEYVENİZİ HASTALIKLARA KARŞI KORUMADA MÜKEMMEL ETKİ.

Etkili Madde	Boscalid 25,2 g/kg + Pyraclostrobin 12,8 g/kg
Formülasyon	WG (Suda dağılılabilen granül)
Etki Mekanizması	Pyraclostrobin; mitokondrial solunum zincirindeki Complex III'e etki eder. Hücrenin enerji tedarikini bloke eder. Solunum ve gelişimi durdurur. Boscalid; mitokondrial solunum zincirindeki Complex II'e etki eder. Amino Asit sentezini bloke eder.

Boscalid®
mitokondride kompleks II
enzimini durdurarak etki eder.



Pyraclostrobin'in quasi-sistemik alınımlı



Özellikleri

- İlacın performansı, iklimsel koşullar ve ortam sıcaklığından etkilenmez.
- İki farklı etki mekanizması sayesinde, dayanıklılık yönetiminde bizi güvenli kılar.
- Koruyucu önleyici etkiye sahip translaminar ve lokal sistemik olarak taşınan bir fungusittir.
- Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelişmesini, spor oluşumunu önler.
- Yapraklarda biriken bir yapı oluşturarak, bitkide içten ve dıştan uzun süreli mükemmel bir koruma sağlar.
- Yağışlarda yıkanmaz.
- IPM (Entegre Mücadele)'ye uygundur.

Kullanım Zamanı ve Şekli

Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, translaminar ve lokal-sistemik olarak taşınan bir fungusittir. Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelişmesini, spor oluşumunu önler. Boscalid ile Pyraclostrobin'in etkileri birleştirilerek, yüksek kontrol sağlayan ve iki farklı etki şekline sahip etkin madde içermesiyle direnç yönetimine ve IPM'e uygun bir ilaç olarak geliştirilmiştir. İyi bir kalıcı etkisi vardır.

Elma ve armut karaleke: 1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı dönemde, 2. ilaçlama: Elmada pembe ve armutta beyaz çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde, 3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde. Diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Elma külleme: 1. ilaçlama: Pempe çiçek tomurcuğu döneminde, 2. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %60-70 döküldüğünde. Diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut memeli pası: 1. ilaçlama: Çiçek gözleri patlaak üzere iken, 2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının %80-90 döküldüğü devrede. Diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Ayva monilyası: 1. ilaçlama: Çiçeklerin %5 açtığı dönemde, 2. ilaçlama: Çiçeklerin %50'si açtığında, 3. ilaçlama: Tam çiçekleme döneminde yapılmalıdır.

Şeftali, kiraz ve vişne çiçek monilyası: 1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (çiçeklerin %5-10'u açtığında), 2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

Kiraz ve vişne meyve monilyası: Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığı karazenk: İlk ilaçlama, hastalık belirtileri görüldüğünde çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Nar kahverengi leke hastalığı: 1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığı dönemde, 2. ilaçlama: Taç yapraklar döküldüğünde, 3. ilaçlama: Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

Mandarinde kahverengi leke hastalığı: Sürgünler 5-10 cm uzunluğa geldiğinde ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.


Nohut antraknoz: İlaçlamaya ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle başlanır. Hastalık şiddeti ve iklim koşulları göz önüne alınarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir.

Toksisitesi

Sıçanlarda akut ağızdan LD₅₀ = 1490 mg/kg



Su deposunu 3/4 oranında doldur




Süzgeç sepetini kaldır



Bellis'i direkt olarak su deposunun içine dök



Sepeti tekrar yerine koy



Depoyu doldurmaya devam et. İkinci olarak herhangi bir eş karışım ekle

**ETİKETTEKİ KARIŞIM
TALİMATLARINI TAKİP EDİNİZ.**