

Fendona® %6 SC

Fendona® %6 SC hızlı ve güvenilir etkisi ile halk sağlığı alanında yapılan profesyonel haşere mücadelesinde temel yardımcınızdır.

Fendona® %6 SC güçlü kontak etkisi ve düşük doz miktarlarında bile yüksek etkili orijinal alphacypermethrin aktif maddesi ile geniş spektrumlu bir koruma ve kontrol sağlar.

Fendona® %6 SC ileri teknoloji ile üretilen mikro-kristal parçacıklı formülasyonu ile etkinlik ve kalıcılık yönünden diğer sentetik piretroidlerden daha etkilidir.

Fendona® %6 SC su bazlı formülasyonu sayesinde kokusuzdur, leke bırakmaz ve irritasyon riski yoktur. Hassas alanlarda yapılan haşere mücadeleleri için hızlı, kolay ve pratik kullanımı ile son derece uygundur.


Orijinal Formülasyonu ile Düşük Dozda Yüksek Performans

Fendona® %6 SC, 60 g/L alphacypermethrin içeren özel süspansiyon konsantre formülasyonundadır.

Sentetik piretroid olan etken madde alphacypermethrin, ileri teknoloji ile üretilen mikro kristal parçacıkları sayesinde uygulandığı yüzeylerde mükemmel ve homojen bir kaplama ve uzun süreli, kalıcı bir etkinlik sağlar.

Mikro kristal parçacıklar, tahta, cam, tuğla, beton, taş, duvar gibi tüm yüzeylerde yüksek bir performansa sahiptir.

İleri teknoloji ile üretilen orijinal alphacypermethrin formülasyonu sayesinde düşük dozlarda yüksek ve güvenli performans elde edilir ve toplamda minimum uygulama maliyeti sağlanır.



Fendona® %6 SC 0,5 lt ambalajdadır.

Geniş Spektrumlu Etkin Haşere Kontrolü

Fendona® %6 SC tüm dünyada birçok haşereye karşı hem iç mekanlar, hem de ticari ve kamu alanlarındaki bireysel ve profesyonel mücadelelerde en yaygın olarak kullanılan insektisitlerden biridir.

Evlerde, ticari tesislerde (gıda işleme tesisleri dahil), okullar, hastaneler, oteller ve restoranlar gibi kamu binalarında kullanıma uygundur.

Hızlı Düşürücü Etki, Uzun Süreli Güvenli Koruma

Fendona® %6 SC tüm dünya çapındaki ününü hızlı düşürücü (knock-down) etki ve uzun süreli kalıcı haşere kontrolü sağlaması ile kazanmıştır.

Formülasyonundaki mikro kristal parçacıkları haşerelerin ayaklarından antenlerine kadar yapışarak, daha ilk temas dakikasında haşereleri duyarlı hale getirmektedir.

Çözülebilir yağlı aktif içeriğin mükemmel biyolojik emilimi 30 dakika gibi kısa bir sürede hızlı düşürücü etkisini gösterir ve 24 saat içinde kesin ölüm gerçekleşir.

İleri teknoloji mikro kristal parçacıklar ürünün fiziksel stabilitesini artırır ve uygulandığı yüzeyde mükemmel bir tutunma sağlar. Bunun sonucu en az 12 hafta süre ile kalıcı bir koruma sağlanmış olur.

Kolay ve Güvenli Kullanım

Su bazlı formülasyonu sayesinde kokusuzdur, leke bırakmaz ve paslanmaya yol açmaz.

Alphacypermethrin düşük buhar basıncına sahiptir ve aromatik solvent içermez. Bu özelliği sayesinde ürün buharlaşma eğiliminde değildir.

Fendona® %6 SC memelilere karşı düşük toksisite değerlerine sahiptir. **Fendona® %6 SC**'nin sıçanlar üzerindeki LD₅₀ değeri 5000 mg/kg'dan büyüktür ve WHO'nun (Dünya Sağlık Örgütü) zararlı maddeler sınıflandırmasında en alt sınıflardan biri olan 3. sınıfta yer almaktadır.

Alphacypermethrin sentetik bir piretroid olduğundan doğada biyolojik olarak parçalanır ve birikmez.

BASF tarafından üretilen alphacypermethrin **AB Biyosidal Ürünler Direktif'i**nde (EU Biocidal Product Directive) desteklenmektedir ve **WHOPES (Dünya Sağlık Örgütü Pestisit Değerlendirme Birimi)** onayına sahiptir.

Fendona® %6 SC

Sprey Uygulamalarında Tek Tercih
Etkin, Hızlı ve Uzun Süreli Kalıcı İnsektisit

Kesin Sonuç İçin Üstün Formülasyon

Fendona® %6 SC istenen konsantrasyonu sağlamak için su ile seyreltilerek kullanılır. Yüzey üzerinde düzgün bir kaplama sağlayarak hedef alanda açık nokta bırakılmayacak şekilde uygulanmalıdır.

KULLANILDIĞI ZARARLILAR			
Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları			
Zararlı Türü - Yaşam Evresi	a.i Dozu	Seyreltme Dozu	İlaçlanacak Alan
Sivrisinek (<i>Aedes aegyptii</i>) (<i>Culex</i> sp.)	20 mg ai/m ²	33 ml ilaç 5 lt su ile karıştırılır.	5 lt çözelti ile 100 m ² alan ilaçlanır.
Karasinek (<i>M. domestica</i>)	15 mg ai/m ²	25 ml ilaç 5 lt su ile karıştırılır.	5 lt çözelti ile 100 m ² alan ilaçlanır.
Hamamböceği (<i>B. germanica</i>)	30 mg ai/m ²	50 ml ilaç 5 lt su ile karıştırılır.	5 lt çözelti ile 100 m ² alan ilaçlanır.
Sert Kene (<i>Rhipicephalus</i> sp.) Yumuşak Kene (<i>Argas</i> sp.)	12 mg ai/m ²	20 ml ilaç 5 lt su ile karıştırılır.	5 lt çözelti ile 100 m ² alan ilaçlanır.



Bu kullanım kılavuzu tavsiye amaçlıdır.
Her ürüne ait kullanım talimatlarına sıkı bir şekilde uyulması gerekmektedir.
Fendona® %6 SC, BASF'nin tescilli markasıdır.
Biyosidal ürünleri dikkatli kullanınız.
Kullanmadan önce etiketi ve ürünle ilgili bilgileri okuyunuz.
Daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki adresle iletişim kurunuz:
BASF Türk Kimya- Tarım Çözümleri
+90 232 332 14 22
www.agro.basf.com.tr

BASF
We create chemistry

BASF
We create chemistry

Fendona® %6 SC

Sprey Uygulamalarında Tek Tercih,
Etkin, Hızlı ve Uzun Süreli Kalıcı İnsektisit

BASF
Profesyonel Çevre Sağlığı Çözümleri

- Orijinal formülasyonu ile düşük dozda yüksek performans
- Geniş spektrumlu etkin haşere kontrolü
- Hızlı düşürücü etki, güvenilir ve kalıcı kontrol
- Kolay ve güvenli kullanım

Haşere ve Zararlı Mücadelenizde En Etkili Çözümleri Sunar

