

# Kemirgen İlaçları

Tarlalarda rodentisit kullanımı için en iyi uygulamalar

## 1. Doğru zararlı için doğru ürünü seçin

BASF, entegre zararlı yönetiminin kullanılmasını teşvik eder. Kullanılan ürünlerin mevcut zararlılara özgü olması gerekir. Herhangi bir rodentisit uygulamasına başlamadan önce, kemirgenlerin büyüme alanlarını en aza indirmek için tüm alternatif besin kaynaklarını ortadan kaldırdığınızdan ve gerekli hijyen koşullarını sağladığınızdan emin olun.

## 2. Etiket talimatlarını takip edin

Etiket yasal bir belgedir ve uyumluluk zorunludur.

## 3. Görev için uygun KKE'ni (Kişisel Koruma Ekipmanı'nı) seçin

Bu ürünü kullanırken yemleme işlemi için eldiven kullanılması gerekmektedir. Ürün ve yem istasyonu ile temas ettikten sonra ellerinizi iyice yıkayın. Ürün uygulanırken sigara içmeyin veya yemek yemeyin.

## 4. Yemi takip edin

Yemleme yaparken, yem noktalarına yerleştirilen **yem istasyonunu** sürekli olarak takip edin. Yem çıkarıldıktan ya da yenisi yerleştirilirken kapağın güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olun, çünkü uygulama yapılan bölgeye giren meraklı hayvanların ürüne erişimi olabilir.

## 5. Yemin sadece hedef zararlı tarafından erişilebilir olduğundan emin olun

Yemin uygun yere sabitlendiğinden emin olun. Yemlerin istenen yerde olduğundan ve hedef dışı canlılar tarafından rahatsız edilmediğinden emin olmak için sık sık göz kontrolü yapılmasını teşvik edin.

## 6. Karkasların imhası

Kemirgen leşlerinin düzenli olarak aranması ve doğru şekilde bertaraf edilmesi ikincil zehirlenme olasılığını azaltır ve bölgenin genel hijyenine katkıda bulunur. Karkasların uygun şekilde bertaraf edilmesi için her zaman yerel kılavuzları takip edin ve bunun belediye yasalarına ve şirketin standart çalışma prosedürlerine uygun olmasını sağlayın.

## 7. Depolama

Kullanılmamış ürünü orijinal kabında, ağzının düzgün kapatıldığından emin olarak çocukların veya evcil hayvanlar da dahil olmak üzere hiçbir hayvanın erişemeyeceği bir yerde saklayın.