

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

### KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Storm® Ultra, konut olarak, ticari, endüstriyel veya tarımsal amaçla kullanılan binaların içinde ve etrafındaki fare ve sıçanların mücadelesi için geliştirilen, kullanıma hazır blok yem şeklinde bir rodentisittir.

| Zararlı Türü | Uygulama Alanı ve Şekli                                                                                                                                                                                  | Uygulama Dozu                                                                                    | Uygulama Aralığı |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fare         | Kapalı alan ve mesken çevresi<br>Birçok yemleme noktası kullanın, pisliklerinin görüldüğü, zarar verdikleri tespit edilen yerler ve diğer aktivite görülen bölgelere istasyon içerisine yem yerleştirin. | 5 g blok yemlerden<br>5 adet (25 g)<br>ya da<br>25 g blok yemlerden<br>1 adet (25 g)             | 1-2 metre        |
| Sıçan        | Kapalı alan ve mesken çevresi<br>Birçok yemleme noktası kullanın, pisliklerinin görüldüğü, zarar verdikleri tespit edilen yerler ve diğer aktivite görülen bölgelere istasyon içerisine yem yerleştirin. | 5 g blok yemlerden<br>10-15 adet (50-75 g)<br>ya da<br>25 g blok yemlerden<br>2-3 adet (50-75 g) | 5-10 metre       |

#### Kullanma şekli:

Storm® Ultra antikoagulan etkili, kullanıma hazır bir preparattır. Kullanmadan önce tüm istila merkezleri, kaçma yolları, girişleri, yuvalanma ve beslenme merkezleri dikkatlice tespit edilmelidir. Karanlık köşeler ve çöplerin biriktiği alanlar, tüm boşluklar ve özellikle sıçanlar için su kaynakları belirlenmeli ve hazır yemler bundan sonra kullanılmalıdır. Mücadeleye yardımcı olmak için hijyen uygulamalarına dikkat edilmelidir. Kemirgenleri çekebilecek ve onlara barınak olabilecek çöpleri temizleyin. Yemlerin tüketilme olasılığını artırmak için, uygulamanın başlangıcında diğer gıda kaynaklarının bulunabilirliğini en aza indirmek önemlidir. Çocukların ve hedef olmayan canlıların erişemeyeceği yerleri istasyon noktası olarak belirleyin. Hedef olmayan hayvanların erişiminin önlenmesi bir önceliktir. Yemler, diğer hayvanlar veya çocuklar tarafından tüketilme riskini en aza indirecek şekilde yerleştirilmelidir. Ürün asla gelişigüzel bir şekilde yerleştirilmemelidir ve yemler açıkta bırakılmamalıdır. Mümkünse, yem istasyonları taşınmayacak şekilde yerleştirilmeli, yere veya yapılarla sabitlenmelidir. Yem istasyonlarını yiyecek, içecek ve hayvan yem kaplarından ve bunlarla temas olan mutfak eşyalarından veya yüzeylerden uzağa yerleştirin.

**Sıçanlar:** Uygun yemleme noktaları olarak, sıçan yuvaları, giriş noktaları, iç mekan gezinme yolları ve bilinen yuvalama alanları belirlenmeli ve her noktaya istasyon içinde yem yerleştirilmelidir. Sıçanların yaşama ve beslenme alanları arasında yemlerden bir bariyer kurmaya çalışın. Yem noktaları ağır istilalarda 5 metre, hafif istilalarda ise 10 metre aralıklı olmalıdır.

**Fareler:** Farelerin kontrolü daha zordur ve alanın araştırılması özellikle önemlidir. Fareler sınırlı bir menzile sahiptirler ve su içmelerine gerek yoktur. Uygun yemleme noktaları olarak delikler, gezinme yolları, teçhizatların arkası-altı ve dışkılarının bulunduğu yerler belirlenmelidir. İç mekanda aktivitenin bulunduğu yerlere, 1 ila 2 metre aralıklı olarak istasyon içinde birer tane yem yerleştirin.

**Kontrol:** 3 gün sonra yemleri inceleyin ve yenilenleri yenileriyle değiştirin. Aynı işlemi 4 gün sonra tekrarlayın. Daha sonrasında bu işlemi 7 günlük aralıklarla tekrarlayın ve yenilen yemleri yenileriyle değiştirin. Normalde 3-4 yemleme turu gereklidir. Yemin 5 haftadan uzun süreli kullanılmaması önerilir. Herhangi bir yem noktasının uzağında bulunacak yem parçaları toplanmalı ve atılmalıdır.

Mücadele esnasında ve uygulama tamamlandıktan sonra ölü kemirgenler aranmalı ve usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Uygulama tamamlandıktan sonra tüm kalan yem istasyonları toplanmalıdır.

Storm® BASF firmasının tescilli markasıdır.

### KULLANICI GRUBU (EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve  
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

## Storm® Ultra

### Formülasyon şekli : Blok

**Etkili madde :** 0.025 g/kg (% 0.0025 a/a) Flocoumafen  
**Kimyasal adı:** 4-hydroxy-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl]-1-naphthyl]coumarin (IUPAC)  
**CAS no:** 90035-08-8

**Yardımcı madde :** %0.001 Denatonium Benzoate  
**Tamamlayıcı maddeler :** % 79.5307 taşıyıcı,  
% 20.4658 diğer maddeler

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN  
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY  
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN,  
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

KULLANIRKEN VE TAŞIRKEN ELDİVEN TAKINIZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

#### ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ:

BASF Agro B.V. İsviçre tarafından, Schirm GmbH, Dieselstrasse 8, 85107 Baar – Ebenhausen – Almanya firmasında fason olarak üretilmektedir.

#### RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı No: 1 D.48  
Ataşehir/İstanbul Tel : 0216 5703400, Faks: 0216 5703779

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içinde kullanınız. Normal depolama koşullarında (25±2 °C) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 2 yıldır.

**Net miktarı:** 100 g (20x5g); 100 g (4x25g); 150 g (30x5g); 150 g (6x25g); 225 g (45x5g); 225 g (9x25g); 275 g (55x5g); 275 g (11x25g); 300 g (60x5g); 300 g (12x25g); 3 kg (600x5g); 3 kg (120x25g); 5 kg (1000x5g); 5 kg (200x25g); 9 kg (1800x5g); 9 kg (360x25g); 375 kg (75.000x5g); 375 kg (15.000x25g); 500 kg (100.000x5g); 500 kg (20.000x25g) (PP ambalaj)

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0  
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı  
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul

Eda SARDAŞ  
Ruhsatlandırma Uzmanı

### ÜRÜN TİPİ (14) RODENTİSİT

#### Zehirlenme belirtileri

Bu ürün antikoagulan bir madde içerir. Yutulursa, gecikebilecek semptomlar, burun kanaması ve diş eti kanaması olabilir. Ciddi vakalarda idrar ve dışkıda morarma veya kan görülebilir.

Ağır vakalarda; iç organlardaki kanama, dolaşım şoku ile sonuçlanabilir ve ölümcül olabilir. Belirtilerin ortaya çıkması, vücuda alınmasından 4 gün sonraya kadar gecikebilir. Yemler, insanların yemesine mani olmak için acılık verici bir madde ihtiva eder.

#### İlk yardım önlemleri

**Solunursa:** Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın. Etkilenen kişi kendini iyi hissetmiyorsa tıbbi yardım alın.

**Deri ile temas ederse:** Sabun ve su ile iyice yıkayın. Etkilenen kişi kendini iyi hissetmiyorsa tıbbi yardım alın.

**Göz ile temas ederse:** Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın. Etkilenen kişi kendini iyi hissetmiyorsa tıbbi yardım alın.

**Yutulursa:** Ağzınızı çalkalayın ve sonra bol su içiniz. Derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını veya etiketini gösterin.

Evcil / hedef dışı bir hayvan tarafından yutulursa veteriner hekim ile iletişime geçin.

#### Antidotu ve gerekli bilgiler

Ürün kumarin tipinde etki şekline sahip, antikoagulan bir rodentisittir. Antidotu Vitamin K1'dir. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA  
MERKEZİ (UZEM)\*NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

### ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ağzı sıkıca kapalı olarak orijinal ambalajında, çocukların, kuşların, evcil hayvanların, çiftlik hayvanlarının erişemeyeceği yerlerde ve kilit altında saklayın.

Serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde, doğrudan güneş ışığından uzakta depolayın.

Ambalajını başka amaçlar için kullanmayın.

Bu ürün, kuşlar ve memeliler dahil olmak üzere evcil hayvanlara tehlikelidir. Hedef olmayan hayvanlara maruziyet önlenmelidir.

#### Arılar için zehirlidir.

#### ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

Zararlılık ifadesi içermemektedir.

#### ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacakları yerde tutun.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.



BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HASERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)