

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 23.12.2020 / 11762

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	50 ml /100 L su	21 gün
Armut	Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	50 ml /100 L su	21 gün
Şeftali	Yaprak kıvrıkcılığı (<i>Taphrina deformans</i>)	100 ml /100 L su	28 gün
Kayısı	Yaprak delen (Çil) (<i>Wilsonomyces carpophilus</i> = <i>Stigmia carpophila</i>)	100 ml /100 L su	28 gün
Kiraz/Vişne	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	100 ml /100 L su	21 gün
Ceviz	Antraknoz (<i>Gnomonia leptostyla</i>)	60 ml /100 L su	42 gün
Antep fıstığı	Karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	75 ml /100 L su	21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırmaya işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinesinin Temizliği

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elma karalekesi:

- uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
- uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
- uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce,
- ve diğer uygulamalar** ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 7 gün aralıklarla yapılmalıdır.

01 Şubat 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Delan® SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu M9 Fungisit (Mantar ilacı)

500 g/L Dithianon

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının 1/4 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, göz ve ciltte tahriş.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

Solonursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Deri ile temas ederse; bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Deri tahrişi veya kaşıntı/kızarıklık olursa; Zehir Merkezine ya da doktora başvurun.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı : 1L E
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Dithianon

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

- H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine neden olur.
H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H319 Ciddi göz hasarına neden olur.
H332 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
H351 Kanserojen etki şüphesi.
H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

ÖNLEM İFADELERİ

- P202 Güvenlikle ilgili önlemlerin tamamı okunup anlaşılmadan elleçlemeyin
P261 Buğusunu solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu kullanın.
P391 Döküntüyü bir araya toplayın.
P405 Kilit altında muhafaza edin.
P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

Dr. A. Sibel VELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No. 0143002384900015 Sicil No. 103411
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey
C Kapısı No. 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Hüketellerer V.D. 143 002 3849

Armut karalekesi:

- uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
- uygulama:** Beyaz rozet döneminde,
- uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce,
- ve diğer uygulamalar** ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 7 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvrıcılığı:

- uygulama:** Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
- uygulama:** İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Kayı yaprak delen (Çil):

- uygulama:** Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
- uygulama:** İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde çiçekler açmadan önce,
- uygulama:** Meyvelerde, çanak yaprağı ve erkek organ tablası (kılıfı) meyvenin ucuna sıyrılırken uygulama yapılmalıdır.

Kiraz/Vişne çiçek monilyası:

- uygulama:** Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin %5-10'u açtığında)
- uygulama:** Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılır.

Ceviz antraknozu:

- uygulama:** Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakçıkların kedi kulağı olduğu dönemde,
- uygulama:** Yapraklardaki, yaprakçıkların yarı büyüklüğü aldığı dönemde,
- uygulama:** Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde yapılır.
- ve diğer uygulamalar:** Yağışlı geçen yerlerde kullanılan fungisit'in etki süresi dikkate alınarak ve enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece tekrarlanır.

Antep fıstığı karazenk:

- uygulama:** İlk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde, 2. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 7 gün aralıklarla yapılır. Delan® SC ile aynı üretim sezonunda üç uygulamadan fazla yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Delan® SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M9 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Delan® SC' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan tek başına kullanınız.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



Delan® SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	M9	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	-------------------------

500 g/L Dithianon

Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın, varsa kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya 15 dakika devam edin. Eğer göz tahrişi uzun süreli ise: Zehir Merkezine veya göz doktoruna danışın.
Yutulursa; derhal ağız su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, Zehir Merkezine ya da doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch
8088 Pfaffikon - İsviçre

ÜRETİM YERİ

BASF Agri-Production S.A.S.
Z.I. Lyon Nord, Rue Jacquard 69727, Genay - Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı
No:3e/ 5-22 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Dr. A. Sibel VELOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No: 103411
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey
C Kapısı No: 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 143 002 3849

01 Subat 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR