

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 20.10.2010 / 8030



QL Agri® 35 SL

Suda çözünebilir konsantre (SL)

Grubu	-	Nematisit (Nematod ilacı)
-------	---	------------------------------

350 g/L *Quillaja saponaria* ekstraktı

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının 1/4 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Gözde tahriş yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. İlk yardım personeli kendi güvenliğine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarınız.

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu
Domates (Sera) Hıyar (Sera) Biber (Sera) Patlıcan (Sera)	Kök ur nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp.)	2000 ml/da (1. ve 2. Uygulamada) 1000 ml/da (3. uygulamada)
Muz (Sera)	Kök ur nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp.)	5000 ml/da (2 uygulama)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar suyla doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

KALİBRASYON

Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 1 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Uygulamadan önceki toprak nemi ilacın başarısı için çok önemlidir. Toprak nemi tarla kapasitesinde olmalıdır. Eğer tarla kapasitesinde değil ise uygulama yapılacak alana damlama sulama sistemi çalıştırılarak 1-2 saat su verilmeli ve daha sonra önerilen dozdaki ilaç bir kap içinde belli miktar suyla karıştırılarak damlama sulama sistemine verilmelidir. İlaçlamadan sonra sistem, toprak tipine bağlı olarak, 5-10 dakika arasında değişen sürede çalıştırılarak ilacın toprağa nüfuzu sağlanmalıdır.

Uygulama zamanı:

Serada; domates, hıyar, biber ve patlıcan kök ur nematodları:

1. uygulama: 2000 ml/da – Fide dikiminden 15 gün sonra
 2. uygulama: 2000 ml/da - birinci ilaçlamadan 15 gün sonra
 3. uygulama: 1000 ml/da – ikinci ilaçlamadan 15 gün sonra
- Uygulama damlama sulama sistemiyle sulama bitimine doğru yapılmalı ve 5-10 dakika daha sulamaya devam edilmelidir.

Net Miktarı : 1 L E
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER

Quillaja saponaria ekstraktı

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ

Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ

- H318 Ciddi göz hasarına neden olur.
H331 Solunması halinde toksiktir.
H335 Solunum sistemini tahriş edebilir.

ÖNLEM İFADELERİ

- P261 Buğusunu solumaktan kaçının.
P271 Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış alanda kullanın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu kullanın.
P405 Kilit altında muhafaza edin.
P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Hazırlar hazırlamaz hemen kullanınız.
- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Ürün yanmaz, paslanmaz ve patlamaz.

Dr. A. Sibel VEDİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No: 103411
Etiler Mah. Beğonia Sok. Nispetiye/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sicil No: 27.522 34746 Atasehir/İSTANBUL
www.basf.com.tr



24-08-2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

fz

Serada yetiştirilen muzlarda kök ur nematodları:

1. uygulama: Nisan- mayıs aylarında (Onarım döneminde)

2. uygulama: birinci ilaçlamadan 3 ay sonra

Uygulama damlama sulama sistemiyle sulama bitimine doğru yapılmalı ve 5-10 dakika daha sulamaya devam edilmelidir.

QL Agri® 35 SL, Şili'ye özgü bir ağaç olan *Quillaja saponaria* Mol. (Quillay)'dan elde edilmektedir. QL Agri® 35 SL, uygulanan bitkilerin savunma sistemini güçlendirdiği için sıcaklık ve kuraklık stresi, toprak hastalık ve zararlıları gibi olumsuz çevre etkileşimlerine karşı bitkilerin dirençlerini artırmaktadır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

® BASF firmasının tescilli markasıdır.

**QL Agri® 35 SL**

Suda çözünebilir konsantre (SL)

Grubu	-	Nematisit (Nematod ilacı)
-------	---	------------------------------

350 g/L *Quillaja saponaria* ekstraktı

Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin. Derhal kortizosteroid doz aerosol inhalasyonu sağlayın.

Deri ile temas ederse; derhal bol su ve sabun ile yıkayın, steril sargı uygulayın, bir cilt uzmanına danışın.

Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü göz kapaklarını açık tutarak 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın. Kontak lens varsa, birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarıp yıkamaya devam edin.

Yutulursa; derhal ağzı su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. İçerisinde şeker bulunan doğal bir ürün olduğu için kutu açılırsa fermente olabilir. Bu nedenle kutu açıldığı zaman tamamının kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA:

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch
8088 Pfaffikon - İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:

BASF CHILE S.A.

Camino a Quintero 201, Comuna de Quintero / Şili

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir

Kuzey C Kapısı No:3e/5-22 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779



24-08-2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. A. Sibel VELOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Nüfus No 0143002364800015 Sicil No 103411

Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey

C Kapısı No: 3e/5-22 Ataşehir / İSTANBUL

www.basf.com.tr