

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarih ve Numarası: 29.11.2022 / 12582

**KULLANILACAĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ*	Külleme ( <i>Erysiphe necator</i> )	125 ml / 100 L su	21 gün
Elma	Elma karalekesi ( <i>Venturia inaequalis</i> )	100 ml / 100 L su	28 gün
Armut	Armut karalekesi ( <i>Venturia pirina</i> )	100 ml / 100 L su	28 gün
Ayva	Monilya ( <i>Sclerotinia linhartiana</i> )	125 ml / 100 L su	28 gün
Kayısı	Çiçek Monilyası ( <i>Monilinia laxa</i> )	100 ml / 100 L su	3 gün
Kiraz/Vişne	Çiçek Monilyası ( <i>Monilinia laxa</i> )	100 ml / 100 L su	7 gün
Şeftali	Şeftali küllemesi ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i> )	100 ml / 100 L su	3 gün
Nektarin	Şeftali küllemesi ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i> )	100 ml / 100 L su	3 gün
Fındık	Külleme ( <i>Erysiphe sp.</i> )	200 ml / 100 L su	28 gün

\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İlaçlama Makinesinin Temizliği**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



**Revyona®**

**Süspansiyon Konsantre (SC)**

Grubu	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	----------------------------

75 g/L Mefentrifluconazole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ**

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarınız.

**Solunursa;** hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

**Deri ile temas ederse;** sabun ve su ile iyice yıkayın. Deri tahrişi veya kaşıntı olursa: Zehir Merkezi'ni veya hekimi arayın.

**Göz ile temas ederse;** etkilenen gözü, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın.

**Yutulursa;** derhal ağzı su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurunuz.

Net Miktarı: 1 L e  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER**

Mefentrifluconazole

**ZARARLILIK İŞARETİ**



**UYARI KELİMESİ**

Dikkat

**ZARARLILIK İFADELERİ**

- H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.  
H411 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir.  
EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

**ÖNLEM İFADELERİ**

- P261 Tozunu/sisini/gazını/dumanını/buharını/serpintiği solumaktan kaçının.  
P272 Kontamine olmuş giysilerin çalışma alanı dışına çıkmasına izin verilmemelidir.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu kullanın.  
P362+P364 Bulaşan giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P391 Döküntüyü bir araya toplayın.  
P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

*Dr. A. Siber V. LOĞLU*  
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Mersis No 0143002384900015 Sicil No 103411  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey  
C Kapsi No 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL  
Büyük İletişimler V.D. 143 002 3849

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



26 Mart 2024

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ****Bağ küllemesi:**

- uygulama:** Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
- uygulama:** Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
- uygulama:** Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
- ve diğer uygulamalar:** Üçüncü uygulamadan sonra tanelerin ben düşme dönemine kadar 10-12 gün aralıklarla devam edilir.

**Elma karalekesi:**

- uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
- uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %60-70'i dökülünce
- ve diğer uygulamalar** ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-13 gün aralıklarla yapılmalıdır.

**Armut Karalekesi:**

- uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- uygulama:** Beyaz rozet döneminde
- uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce
- ve diğer uygulamalar** ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-13 gün aralıklarla yapılmalıdır.

**Ayva monilyası:** Uygulama yapılmadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

- uygulama:** Çiçeklerin %5' i açtığında,
- uygulama:** Çiçeklerin %50'si açtığında,
- uygulama:** Tam çiçeklenme döneminde (çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

**Kayısı, Kiraz/Vişne çiçek monilyası:**

- uygulama:** Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin %5-10'u açtığında)
- uygulama:** Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

**Şeftali ve Nektarinde külleme:**

- uygulama:** Sürgünler yaklaşık 20 cm olduğunda yapılır.
- ve diğer uygulamalar** Enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar 10-14 gün aralıklarla yapılır.

**Fındıkta külleme:** Külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak 14 gün sonra ikinci uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**

Revyona® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için, Revyona® yı etiketindeki hastalıklara karşı aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayacak şekilde kullanınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU**

Eğer diğer ilaçlar ile bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.



# Revyona®

**Süspansiyon Konsantre (SC)**

Grubu	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	----------------------------

75 g/L Mefentrifluconazole

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ**

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

© BASF firmasının tescilli markasıdır.

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 3 (üç) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

**ÜRETİCİ FİRMA**

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) – Freienbach Şubesi,  
8088 Pfaffikon SZ / İsviçre

**ÜRETİM TESİSİ**

BASF Espanola S.L Carretera (Ctra.) Nacional N-340 km 1.156  
43006, Tarragona / İspanya

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı  
No:3e/ 5-22 Ataşehir / İstanbul  
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

*Dr. A. Sibel VALİOĞLU*  
Ruhsatlandırma Müdürü

**BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No: 103411  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey  
C Kapısı No: 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL  
Büyük İkizeliler V.D. 143 002 3849

26 Mart 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

