

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 29.11.2022 / 12582

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ*	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	125 ml/100 L su	21 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	100 ml/100 L su	28 gün
Armut	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	100 ml/100 L su	28 gün
Ayva	Monilya (<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	125 ml/100 L su	28 gün
Kayısı	Çiçek Monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Kiraz/Vişne	Çiçek Monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	100 ml/100 L su	7 gün
Şeftali	Şeftali küllemesi (<i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Nektarin	Şeftali küllemesi (<i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Fındık	Külleme (<i>Erysiphe sp.</i>)	200 ml/100 L su	28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

10 Eylül 2024



Revyona®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	---	----------------------------

75 g/L Mefentrifluconazole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Çocuktan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

N. Arıcan
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı



Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:

1/3

İÇİNDEKİLER

Mefentrifluconazole

ZARARLILIK İŞARETLİ



UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ

- H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H411 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir.
EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

- P261 Tozunu/sisini/gazını/dumanını/buharını/serpintiyi solumaktan kaçının.
P272 Kontamine olmuş giysilerin çalışma alanı dışına çıkmasına izin verilmemelidir.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu kullanın.
P362+P364 Bulaşan giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P391 Döküntüyü bir araya toplayın.
P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

Eda Sardaş

Eda SARDAŞ
Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Bagonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 48 34745 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 143C023849

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**Bağ küllemesi:**

- 1. uygulama:** Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
- 2. uygulama:** Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
- 3. uygulama:** Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
- 4. ve diğer uygulamalar:** Üçüncü uygulamadan sonra tanelerin ben düşme dönemine kadar 10-12 gün aralıklarla devam edilir.

Elma karalekesi:

- 1. uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2. uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
- 3. uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %60-70'i dökülünce
- 4. ve diğer uygulamalar** ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-13 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut Karalekesi:

- 1. uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2. uygulama:** Beyaz rozet döneminde
- 3. uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce
- 4. ve diğer uygulamalar** ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-13 gün aralıklarla yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE FİTAN KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKİRNEZ ŞİŞİLERİ

19 0 Eylül 2024



Revyona®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	---	----------------------------

75 g/L Mefentrifluconazole

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarınız.

Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Deri ile temas ederse; sabun ve su ile iyice yıkayın. Deri tahrişi veya kaşıntı olursa: Zehir Merkezi'ni veya hekimi arayın.

Göz ile temas ederse; etkilenen gözü, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın.

Yutulursa; derhal ağzı su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Eda SARDAŞ

Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nispetiye Atasehir Batı
No:1 İç Kapı No: 4B 34746 Atasehir / İstanbul
BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. 1436023849

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 3 (üç) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

Ayva monilyası: Uygulama yapılmadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

1. uygulama: Çiçeklerin %5' i açtığında,

2. uygulama: Çiçeklerin %50'si açtığında,

3. uygulama: Tam çiçeklenme döneminde (çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

Kayısı, Kiraz/Vişne çiçek monilyası:

1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin %5-10'u açtığında)

2. uygulama: Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

Şeftali ve Nektarinde külleme:

1. uygulama: Sürgünler yaklaşık 20 cm olduğunda yapılır.

2. ve diğer uygulamalar Enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar 10-14 gün aralıklarla yapılır.

Fındıkta külleme: Külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak 14 gün sonra ikinci uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Revyona® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için, Revyona®'yı etiketindeki hastalıklara karşı aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayacak şekilde kullanınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Eğer diğer ilaçlar ile bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.



Revyona®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	---	----------------------------

75 g/L Mefentrifluconazole

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

® BASF firmasının tescilli markasıdır.

ÜRETİCİ FİRMA

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) – Freienbach Şubesi,
8088 Pfaffikon SZ / İsviçre

ÜRETİM TESİSİ

BASF Espanola S.L Carretera (Ctra.) Nacional N-340 km 1.156
43006, Tarragona / İspanya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Handwritten signature/initials.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İBUL EDİLMİŞTİR

11 0 Eylül 2024

Handwritten signature: N. Arıgan
Dr. Nesrin ÇAKIR ARIGAN
Dalre Başkanı
Official stamp: T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Handwritten signature: Eda Sardaş

Eda SARDAŞ
Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849