

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 13.08.2021 / 11947

KULLANILACĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/da (Larva-Pupa-Ergin)	35 gün
	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	10 ml/da (Nimf-Ergin)	
	Yaprakpireleri (<i>Empoasca decipiens</i> , <i>Asymmetrasca decedens</i>)	40 ml/da (Nimf-Ergin)	
Elma	Elma Yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	10 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	21 gün
Elma	Elma Pamuklubiti (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	50 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	21 gün
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	50 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	21 gün
Antep fıstığı	Antep fıstığı psillidi (<i>Agonoscaena pistaciae</i>)	50 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	14 gün
Şeftali	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	10 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	21 gün
Portakal Mandarın Limon Greyfurt	Turunçgil yaprakbitleri (<i>Aphis citricola</i> ; <i>Toxoptera aurantii</i>)	10 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	21 gün
Portakal Mandarın Limon Greyfurt	Turunçgil Unlubiti (<i>Planococcus citri</i>)	50 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	21 gün

*Turunçgillerde faydalılara karşı yan etki denemesi yapılmıştır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



Ventigra

Disperse Olabilen Konsantre (DC)

Grubu	9D	İnsektisit (Böcek ilacı)

100 g/L Afidopyropen

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik

Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Afidopyropen

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ

TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H315 Cilt tahrişine neden olur
H331 Solunması halinde toksiktir.
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

ÖNLEM İFADELERİ

P261 Buğusunu solumaktan kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanınız.
P391 Döküntüyü bir araya toplayınız.
P403+P233 İyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz. Sıkıca kapalı kapta muhafaza ediniz.
P405 Kilit altında muhafaza ediniz.
P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyunuz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Eda Sardaş

Eda SARDAŞ

Ruhsatlandırma Uzmanı,
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Bagonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 40 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Tütün beyazsineği: Tesadüfen seçilen 50 bitkinin 1 alt ve 1 üst yapraklarında olmak üzere toplam 100 yaprakta sayım yapılır. Taraklanma başlangıcından sonraki larva+pupa sayımı için ise seçilen her sayım ünitesinde 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 20 bitki alınır. Her bitkiden 1 üst, 1 orta ve 1 alt yaprak olmak üzere toplam 60 yaprağın tüm yüzeyinde sayım yapılır. Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğu mücadeleye başlanmalıdır.

Ergin sayımları için zararlıların daha az hareketli ve uyusuk olduğu sabahın erken saatleri tercih edilmelidir. Taraklanma başlangıcına kadar her bitkiden bir yaprakta, taraklanma başlangıcından sonra ise her bitkinin üst yarısından tepe kısmına ve orta bölümüne yakın iki yaprakta olmak üzere 100 yaprakta sayım yapılır. Sayımın sonunda yaprak başına ergin sayısı saptanır.

Pamuk yaprakbiti: Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise bir yaprakta ortalama 25 (yirmi beş) yaprakbiti saptandığında mücadeleye başlanmalıdır. İlaçlama bitkilerin üzerinden çiğ kalktıktan sonra tek ilaçlama olacak şekilde yapılır.

Yaprakpireleri: Sürveylerde 50 da'lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Herbölümünden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısımdan adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde alınan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 (on) adet yaprak piresi saptandığında mücadeleye başlanmalıdır. İlaçlama bitkilerin üzerinden çiğ kalktıktan sonra tek ilaçlama olacak şekilde yapılır.

Elma Yeşil Yaprakbiti: Vegetasyon süresince kontrol edilen 100 sürgünden 15'li bulaşık olarak görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma Pamuklubiti: Yapılan kontrollerde, sürgünlerin %10'unda Elma Pamuklubiti kolonisi saptanınca mücadele yapılır. Yeni bulaşmalar olduğu takdirde 15 gün sonra ilaçlama tekrar edilir.

Armut Psilidi: Bölgelere göre değişmekle birlikte mart- nisan aylarında yapılan sürgün kontrollerinde kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15'den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Antep fıstığı Psilidi: Haftalık yapılan sayımlarda 100 bileşik yaprakta; bileşik yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların birçoğu açıldığında, parazitoid çıkışının başlamadığı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Şeftali Yaprakbiti: Çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4'ü kanatlı forma dönüşüncüye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

**Ventigra****Disperse Olabilen Konsantre (DC)**

Grubu	9D	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

100 g/L Afidopyropen**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarınız.

Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Deri ile temas ederse; Derhal sabun ve suyla iyice yıkayın, tıbbi yardım isteyin.

Göz ile temas ederse; etkilenen gözü, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın, bir göz uzmanına danışın.

Yutulursa; derhal ağız su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

03-09-2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Suda yaşayan canlılara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Tozlayıcı böceklerin maruziyetini en aza indirmek için, çiçeklenme dönemindeyken akşam saatlerinde uygulama yapınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

Eda SARDAŞ

Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384000015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Bagonya Sk. Nidakule Atasehir Bah
No:1 İç Kapı No: 40 34746 Atasehir / Istanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

Turunçgil Yaprakbitleri: Uygulama Mart ve Nisan aylarında ağır (bir ağaçta ortalama 15'den daha fazla sürgün bulaşksa) bulaşmanın görüldüğünde yapılmalıdır.

Turunçgil Unlubiti: Bahçedeki meyveler fındık (greyfurtta ceviz büyüklüğünde) iriliğine geldiği zaman ağacın 4 ayrı yönünden ve içten her ağaç için 5'er meyve olmak üzere toplam 100 meyve kontrol edilir. Kontrol edilen meyvelerin en az 15 adedi bulaşık ise uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Ventigra® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 9D olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Ventigra®'nın etiketindeki zararlılara karşı aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam iki uygulama sayısını aşmayınız. Tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 9D harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Dğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



Ventigra

Disperse Olabilen Konsantre (DC)

Grubu	9D	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

100 g/L Afidopyropen

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

® BASF firmasının tescilli markasıdır.

ÜRETİCİ FİRMA

BASF Agrochemical Products B.V. (PR),
State Road No. 2, KM 47.3, 00674, Manati, Puerto Riko

ÜRETİM TESİSİ

BASF Agri-Production S.A.S.,
Z.I. Lyon Nord, Rue Jacquard, 69727 Genay, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779



03-09-2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Eda SARDAŞ

Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No:48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 143C023849