

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 14.09.2023/12861

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	20 ml/da (Larva)	35 gün
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	15 ml/da (Ergin, larva)	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI


Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Patates tarlalarındaki zararlı ilaçlamalarında ilaç normu genel bir referans olarak 15-50 L/da olmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



Cimegra® SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	30	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

100 g/L Broflanilide

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 12 saat süreyle insan ve hayvan girişine izin vermeyiniz.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Alerjik reaksiyona neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın. Maruziyet ya da etkilenme halinde, Sağlık desteği alın.

Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Deri ile temas ederse; Derhal sabun ve suyla iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse; etkilenen gözü, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın.

Yutulursa; derhal ağız su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER
Broflanilide

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H351	Kanserojen etki şüphesi.
H400	Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
H410	Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.
EUH208	Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P201	Kullanmadan önce özel kullanma talimatları alın.
P202	Güvenlikle ilgili önlemlerin tamamı okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P280	Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük veya maske kullanın..
P391	Döküntüyü bir araya toplayın.
P405	Kilit altında muhafaza edin.
P501	Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.
EUH401	İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

Feride YİĞİT
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Agricultural Solutions
Turkey Kimya Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 İç Kapı No: 48
34746 Ataşehir / İstanbul
Kozyatağı V.D.: 1431681758

12 Ağustos 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLDİ



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamukta yeşilkurt: 50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite kabul edilir ve yaklaşık olarak birbirine eşit üç bölüme ayrılır. Her bölümde rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Patatesta patates böceği: Günlük ortalama sıcaklık 14-15°C'ye ulaştığında tarlaya köşegenler istikametinde girilerek, ocaklarda zararlıların yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci dölle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci dölle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmez. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40'a kadar çıkmaktadır.

Cimegra® SC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Cimegra® SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 30 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Cimegra® SC'nin etiketindeki zararlılara karşı aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam iki uygulama sayısını aşmayınız. Tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 30 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



Cimegra® SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	30	İnsektisit (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

100 g/L Broflanilide



12 Ağustos 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Yılda en fazla dekara toplam 5 g aktif madde uygulama oranını aşmayınız.
- Suda yaşayan organizmalara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını bitki koruma ürünü ile buluşturmayınız.
- Hedef dışı arthropodlara zehirlidir. Faydalı böcekler kullanıldığında UYGULAMAYIN.
- Arılara zehirlidir. Arılar, ilaçlama esnasında doğrudan veya ilacın sürüklenmesi ile, ya da yaprağın üzerindeki veya çiçekli bitkiler ile yabani otların polen ve nektarları üzerindeki kalıntılar yoluyla bitki koruma ürününe maruz kalabilirler. Bitkiler çiçeklenme dönemindeyken UYGULAMAYIN. Arılar tarla yüzeyinde bulunan çiçekli yabani otlarda yiyecek arıyorken ilaçlama yapmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA

BASF Agrochemical Products B.V. (PR), Puerto-Rico Branch
Road No. 2, KM 47.3, 00674, Manati, Puerto Rico, ABD

ÜRETİM TESİSİ

BASF Agricultural Solutions US LLC
14284 Highway 41 North, Sparks, Georgia, 31647, A.B.D.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BASF Agricultural Solutions Turkey Kimya Ticaret Anonim Sirketi
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

**BASF Agricultural Solutions
Turkey Kimya Ticaret A.Ş.**

Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 İç Kapı No: 48
34746 Ataşehir / İstanbul
Kozyatağı V.D.: 1431681758

Feride Yiğit
Ruhsatlandırma Müdürü