

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 25.03.2014 / 9568

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Clearfield Plus Ayçiçeği çeşitleri	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Dikenli yabancı marul (<i>Lactuca serriola</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Yeşil kirpi darı (<i>Setaria viridis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	200 ml/da Ayçiçeğinin 4-6 gerçek yapraklı ve yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde
IMI Toleranslı A.I.R. Ayçiçeği çeşitleri	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yabancı turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	200 ml/da Ayçiçeğinin 4-6 gerçek yapraklı ve yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde
Yer fıstığı	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Fener otu (<i>Physalis angulata</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum bellardii</i>) Yabancı turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	160 ml/da Çıkış sonrası Yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde
Fasulye	Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum bellardii</i>)	160 ml/da Çıkış sonrası Yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde
Bezelye	Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum bellardii</i>) Yabancı turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Kuşotu (<i>Stellaria media</i>)	160 ml/da Çıkış sonrası Yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde



Intervix® Plus

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	--------------------------------

25 g/L Imazamox

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

29 -06- 2026



Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:

1/3

İÇİNDEKİLER:

Imazamox

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ:

DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H411 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir.
EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların ulaşamayacakları yerde tutun.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.
P391 Döküntüyü bir araya toplayın.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Clearfield Plus markalı olmayan ayçiçeği çeşitlerinde kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama sırasında diğer kültür bitkilerine sıratmayınız ve sulama sularına bulaştırmayınız.
- Ayçiçeği bitkilerinin uygun büyüme koşullarında uygulanmalıdır. Bitkilerin gelişmesine uygun olmayan düşük sıcaklık, aşırı nem veya kurak koşullarda uygulanmamalıdır.
- Uygulamalar yağışsız ve sakın günlerde yapılmalıdır.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Hedef dışı bitkilere ve alanlara sürüklenmeyi önleyici tedbirler alınmalıdır.

**BASF Agricultural Solutions
Turkey Kimya Ticaret A.Ş.**

Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 İç Kapı No: 48
34746 Ataşehir / İstanbul
Kozyatağı V.D.: 1431681758

Feride Yiğit
Ruhsatlandırma Müdürü

Soya	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yeşil kirpi danı (<i>Setaria viridis</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası Yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde
Yonca	Küsküt (<i>Cuscuta</i> spp.)	200 ml/da Çıkış sonrası Yoncanın 8-10 yapraklı döneminde

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İlaç, yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 2-3 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.

Clearfield Plus Ayçiçeği çeşitleri, IMI Toleranslı A.I.R. Ayçiçeği Çeşitleri, Yer fıstığı, Fasulye, Bezelye, Soya ve Yoncada uygulama zamanı ve şekli: Kültür bitkilerinin erken dönemlerinde ve yabancı otların 2-4 gerçek yapraklı dönemlerinde, yoncanın 8-10 yapraklı döneminde uygulama yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalı ve ilaçlama anında memeler kültür bitkisinin tepesinden 40-50 cm yüksek olmalıdır. İlaç, damlacıklar otlar üzerinde kuruduktan sonra yağın yağmurla yıkanmaz. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10 °C üzerinde seyretmesi ilacın etkinliğini artırır.



Intervix® Plus

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
--------------	-------------	--

25 g/L Imazamox

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Deri ile temas ederse; bol su ve sabun ile yıkayın.

Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akan su altında yıkayınız.

Yutulursa; derhal ağız su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİŞİ:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

Feride YİĞİT
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Agricultural Solutions
Turkey Kimya Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 İç Kapı No: 48
34746 Ataşehir / İstanbul
Kozyatağı V.D.: 1431681758

29-06-2026

TEKİRNEZ BAŞKANLIĞI
ZARFI KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKİRNEZ

Osman ARLI
Daire Başkanı

10 1

Stres altında bulunan ayçiçeği bitkilerine (zararlı, hastalık, su baskını, don, zayıf tohum yatağı veya önceki bitki koruma ürünlerinin etkisi) ürün uygulanmamalıdır, çünkü bu durumda kültür bitkisinde zarar riski artar. Islak bitki örtüsüne (yağmur veya çiğ nedeniyle) uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama yapılan alana, 12 ay boyunca kışlık kolza ve diğer turpgiller familyasına ait kültür bitkileri ile şeker pancarı ekilmemelidir! Kültür bitkisinin herhangi bir nedenle zarar görerek gelişmemesi veya yok olması durumunda, aynı alana sadece baklagil bitkileri veya imidazolinonlara dayanıklı kültür bitkileri ekilmelidir.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

Intervix® Plus hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Intervix® Plus adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 2(B) olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Intervix® Plus'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip [Grup 2(B) harici] bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez.



Intervix® Plus

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	--------------------------------

25 g/L Imazamox

® BASF firmasının tescilli markasıdır.

29 -06- 2026

İL VE ORMAN BAKANLIĞI
TİCARET KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

ÜRETİCİ FİRMA:

BASF Agrochemical Products B.V., Puerto Rico Branch Road
#2,Km 47.3 Manatí, PR 00674, ABD

ÜRETİM TESİSİ:

BASF Agri-Production S.A.S.
Port 7502, 7502 Route du Vieux Chemin de Loon
F59820 Gravelines, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

BASF Agricultural Solutions Turkey Kimya Ticaret Anonim Şirketi
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Feride Yiğit
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Agricultural Solutions
Turkey Kimya Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 İç Kapı No: 48
34746 Ataşehir / İstanbul
Kozyatağı V.D.: 1431681758

