

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 29.05.2000 / 3778

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki veya Kullanım Alanının Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu
Clearfield Ayçiçeği Çeşitleri	Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Canavar otu (<i>Orobancha cernua</i>) Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	125 ml/da Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı döneminde
Yonca	Küsküt (<i>Cuscuta spp.</i>)	125 ml/da Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde
Bezelye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i> , <i>P. convolvulus</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Isırgan Otu (<i>Urtica urens</i>) Yavşan otu (<i>Veronica cymbalaria</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası
Fasulye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria spp.</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası



Intervix® Pro

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	-----------------------------

40 g/L Imazamox

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

29 -06- 2026

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
İmazamox

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ:
DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.
EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.
P391 Döküntüyü bir araya toplayın.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

Feride YİĞİT
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Agricultural Solutions
Turkey Kimya Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 İç Kapı No: 48
34746 Ataşehir / İstanbul
Kozyatağı V.D.: 1431681758



Soya	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sütleğen (<i>Euphorbia spp.</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	125 ml/da Erken çıkış sonrası
Yerfıstığı	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>E.colonum</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası
	Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Çukurova fener otu (<i>Physalis angulata</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	125 ml/da Erken çıkış sonrası

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İlaç, yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.

İmidazolinone toleranslı Clearfield Ayçiçeği çeşitlerinde uygulama zamanı ve şekli: Temel problem Canavar otu ise, ayçiçeğinin 6-8 gerçek yapraklı döneminde; temel problem pıtrak ve etikette belirtilen diğer yabancı otlar için ise 4-6 gerçek yapraklı döneminde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalı ve ilaçlama anında memeler ayçiçeği bitkilerinin tepesinden 40-50 cm yüksekte olmalıdır. Dekara 20-30 litre su kullanılmalıdır. İlaç, damlacıklar otlar üzerinde kuruduktan sonra yağın yağmurla yıkanmaz. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10 °C üzerinde seyretmesi ilacın etkinliğini artırır.



Intervix® Pro

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
--------------	-------------	--

40 g/L Imazamox

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın.

Deri ile temas ederse; bol su ve sabun ile yıkayın. Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayınız.

Yutulursa; derhal ağzı su ile çalkalayın ve ardından bol su için.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

29 -06- 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. ÇEVRE, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Clearfield markalı olmayan ayçiçeği çeşitlerinde kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama sırasında diğer kültür bitkilerine sıçratmayınız ve sulama sularına bulaştırmayınız.
- Ayçiçeği bitkilerinin uygun büyüme koşullarında uygulanmalıdır. Bitkilerin gelişmesine uygun olmayan düşük sıcaklık, aşırı nem veya kurak koşullarda uygulanmamalıdır.
- İklim ve toprak koşullarının uygun gitmediği dönemlerde herbisit uygulamaları sararma vb görüntüler oluşturabilmektedir. Bu tür belirtiler normal olup, kısa sürede ortadan kalkar.
- Uygulamalar yağışsız ve sakın günlerde yapılmalıdır.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
- Boş ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız.
- Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

Feride YİĞİT
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Agricultural Solutions
Turkey Kimya Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 İç Kapı No: 48
34746 Ataşehir / İstanbul
Kozyatağı V.D.: 1431681758

İntervix® Pro hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

İntervix® Pro adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 2(B) olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Intervix® Pro' nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 2(B) hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



İntervix® Pro

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
--------------	-------------	--

40 g/L Imazamox

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

© BASF firmasının tescilli markasıdır.

29 -06- 2026

İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
MÜHÜRÜ
İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA:

BASF Agrochemical Products B.V.,
Puerto Rico Branch Road #2, Km 47.3 Manati, PR 00674, ABD

ÜRETİM YERİ:

BASF Agri Production S.A.S,
7502 Route du Vieux Chemin de Loon
F59820 Gravelines / Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

BASF Agricultural Solutions Turkey Kimya Ticaret Anonim Şirketi
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Feride YİĞİT
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Agricultural Solutions
Turkey Kimya Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 İç Kapı No: 48
34746 Ataşehir / İstanbul
Kozyatağı V.D.: 1431681758



İl