



We create chemistry

Libfer® SP

4.0%

4.0% Fe chelated by ortho-ortho EDDHA
Containing 6.0% min. Fe

EC FERTILISER

MINERAL MICRONUTRIENT FERTILISER – PFC 1(C)(II)(a)

For the treatment of iron deficiency in crops and ornamentals growing in adversely alkaline and calcareous soils by soil application and fertigation.

5 kg e net

EC FERTILIZER
DEMİR ŞELATİ-EDDHA

Libfer® SP

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w / w)
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 6
EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe)	% 5
Ortho - Ortho EDDHA Şelatlı Demir (Fe)	% 4

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH aralığı Fe için: 4-11

UYGULAMA DOZAJLARI (İhtiyaç duyuldukça)

Ürünler	Toprakdan, Damlamadan
Tarla Bitkileri (pamuk, hububat, çeltik, mısır, nohut, soya, kavun, karpuz vb.)	250 - 550 g / dekar (tohum ekiminden, fide dikiminden hemen önce veya bitkilerde demir noksanlığı görülmeye başladığında kullanılmalıdır)
Yumrukluk bitkiler (Şekerpancarı, havuç, patates, soğan vb.)	250 - 550 g / dekar (tohum ekiminden, fide dikiminden hemen önce veya bitkilerde demir noksanlığı görülmeye başladığında kullanılmalıdır)
Tüm sera ve açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, biber, patlıcan vb.)	250 - 550 g / dekar (tohum ekiminden, fide dikiminden hemen önce veya bitkilerde demir noksanlığı görülmeye başladığında kullanılmalıdır)
Turungçiller (portakal, limon, vb.)	500 - 750 g / 100 m ²
Genç ağaçlar	200 - 500 g / ağaç
Meyve veren ağaçlar	100 - 150 g / ağaç
Yıllık bakım	25 - 125 g / ağaç (Ağaçların büyüklüğüne göre uygun doz kullanılmalıdır. Ağaç iz düşümüne gelecek şekilde toprağa karıştırılmalıdır)
Tüm meyve ağaçları (Elma, armut, şeftali, erik, badem, antepiştigi, zeytin vb.)	600 - 800 g / 100 metre sıraya
Bağ ve üzüm su meyveler (Çilek, ahududu, v.b.)	60 g / 10 m ²
Tek yıllık / çok yıllık kesme çiçekler, yeşil alanlar	

Hidrofonik üretim: 17 gram Libfer® SP 1.000 litrelik besleme çözeltisine eklenerek, yaklaşık 1 ppm'lik demir konsantrasyonu elde edilebilir.

UYARILAR

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Çocuklardan, gıdalardan, evcil ve çiftlik hayvanlarından uzak tutunuz.

Çalıştıktan sonra ve yemeklerden önce ellerinizi yıkayınız.

Uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.


Koruyucu elbise, koruyucu eldiven, koruyucu siperlik/gözlük ve maske kullanınız.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.



DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında, normal şartlar altında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 4 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı: +5/+40 °C arasında olmalıdır.

FİRMA BEYANI Firmamız yalnız ürün içeriğinden sorumludur ve bu ürünün yanlış, uygun olmayan kullanımından doğabilecek herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez.

Tescil No	:	
Lisans No	:	
Üretim Tarihi	:	
Son Kullanma Tarihi	:	
Parti No	:	
Net Ağırlık	:	5 kg e

BASF Agricultural Solutions Turkey Kimya Ticaret A.Ş. Barbaros
Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı No:11Ç Kapı No: 48 34746
Ataşehir / İstanbul
Ko yatağı V.D.: 1431681758

İTHALATÇI FİRMA : BASF Agricultural Solutions Turkey Kimya Ticaret A.Ş.

ADRES: Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı No: 1

İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: 0216 570 34 00 Fax: 0216 570 37 79

Product n°: 30654526

Manufactured by/
Fabbricante/الصانع

BASF SE

Carl-Bosch-Straße 38

67056 Ludwigshafen

Germany

Tel.: +49 (0) 621 60-0

24hr Emergency

Tel.: +49 (0) 180 2273 112

® = Registered trademark
of BASF

67614697

06/2022