

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj no :
Ruhsat Tarihi ve No.su : 10.06.2009/6976

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	100 ml/100 L su	7 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	500 ml/100 L su Dormant dönem 250 ml/100 L su Normal dönem	7 gün
Turunçgiller	Kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i> f.sp. <i>citri</i>)	150 ml/100 L su	7 gün
Domates (sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	150 ml/100 L su	3 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	250 ml/100 L su	14 gün
Şeftali	Yaprak kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	300 ml/100 L su	7 gün
Zeytin	Halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginea</i>)	250 ml/100 L su	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli bir alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

21 Subat 2019

GENNOVA Tarım İlaçları San. ve Tic. A.Ş.



SUPERA SC®

AKICI KONSANTRE (SC)

Grubu	M	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	---	-------------------------

350 g/l Metalik bakıra eşdeğerdir bakır hidroksit

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMIŞ SAHAYA 2 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ağızda madeni bir lezzet, kanlı ishal, yeşil-mavi renkli kusma, hızlı soluma, heyecan, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, fazla alındığında (5-8 g) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı görülür.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Bilgiler: Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Etkiler gecikebilir. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Doktora başvurun. Dinlenme, sıcaklık ve temiz hava sağlayın. Solunum zorluğu çekildiğinde gereken şekilde eğitilmiş personel tarafından oksijen verilebilir.

Yutma: Ürün yutulduğu takdirde, kişiye bol süt, yumurta beyazı, jelatin solüsyonu ve ya hiçbirisi yoksa bol miktarda su içirin. Sıvı berrak hale gelene kadar kusturun. Mide temizlenmesi süt, su, sodyum bikarbonat solüsyonu veya %0.1 lik potasyum ferrosiyenid solüsyonu ile yapılabilir. Bu formu, ambalajı ve ya ürün etiketini yanınıza alarak bir an önce bir doktorla irtibata geçin. Kaçınılması gereken hareketler: Bilinci yerinde olmayan kişiye ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin. Ürünü ısıdan koruyun, yanması halinde zehirli gaz salgılar. Hiçbir durumda alkol kullanmayınız.

Net Miktarı :
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV' li) :

İçindekiler : Bakır Hidroksit



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H330 Solunması halinde öldürücüdür.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P260 Spreyini solumayın.

P264 Elleçlemeden sonra ağız, yüz ve gözleri bol su ile iyice yıkayın.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

GENNOVA
TARIM İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Bul. No: 280/101 Alsancak / İZMİR
Tel: (0.232) 464 23 85 • Faks: (0.232) 464 23 95
Kordon V.D. 394 045 6805

Feride Yiğit
Teknik Müdür

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ mildiyözü

1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı)

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
3. Uygulama: Meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Turuncgilde kahverengi leke:

Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.

Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Domates mildiyözü

Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Elma karaleke

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)
2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70 - 80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Şeftali yaprak kıvrıcılığı:

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Zeytinlerde halkalı leke

Ege Bölgesinde:

1. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Akdeniz Bölgesinde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

21 Şubat 2019

GENNOVA Tarım İlaçları San. ve Tic. AŞ.



SUPERA SC®

AKICI KONSANTRE (SC)


Grubu	M	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	---	-------------------------

350 g/l Metalik bakıra eşdeğerdir bakır hidroksit

Ciltle Temas: Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri 15 dakika boyunca akan su ve sabun ile yıkayın. Bitki koruma ürününün bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Herhangi bir tahriş durumunda, ambalaj, etiket, broşür veya reçeteyi yanınıza alarak bir doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse ambalaj, etiket, broşür ve zirai reçete ile doktora gidiniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Balıklara zehirlidir.

Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.

Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Anlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile; imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı ürününün hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez. Normal depolama şartları altında, açılmamış orijinal ambalajında fiziksel ve kimyasal özelliklerini iki yıl muhafaza eder.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

GENNOVA Tarım İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ

Cumhuriyet Bulvarı No:280 /101 Alsancak, İZMİR

Tel: (0232) 464 23 85 Faks: (0232) 464 23 95

ÜRETİCİ FİRMA:

Oxiquimica Agrociencia Ltda

Rua Minervino de Campos Pedroso No:13 Jaboticabal

Sao Paulo, Brezilya Tel: +55 16 3209 1313

ÜRETİM TESİSİ:

Oxiquimica Agrociencia Ltda

Rua Minervino de Campos Pedroso No:13 Jaboticabal

Sao Paulo, Brezilya Tel: +55 16 3209 1313

GENNOVA
TARIM İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET AŞ
Cumhuriyet Bul. No: 280/101 Alsancak / İZMİR
Tel: (0.232) 464 23 85 • Faks: (0.232) 464 23 95
Kordon V.D. 394 045 6805

Feride YİĞİT
Teknik Müdür

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: SUPERA SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup "M" olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için SUPERA SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmadan önce ön karışım testi mutlaka yapılmalıdır.

GENNOVA Tarım İlaçları San. ve Tic. AŞ.



SUPERA SC®

AKICI KONSANTRE (SC) SIVI

Grubu	M	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	---	-------------------------

350 g/l Metalik bakıra eşdeğerdir bakır hidroksit

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

GENNOVA Tarım İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ
Cumhuriyet Bulvarı No:280 /101 Alsancak, İZMİR
Tel: (0232) 464 23 85 Faks: (0232) 464 23 95

ÜRETİCİ FİRMA:

Oxiqumica Agrociencia Ltda
Rua Minervino de Campos Pedrosa No:13 Jaboticabal
Sao Paulo, Brezilya Tel: +55 16 3209 1313

ÜRETİM TESİSİ:

Oxiqumica Agrociencia Ltda
Rua Minervino de Campos Pedrosa No:13 Jaboticabal
Sao Paulo, Brezilya Tel: +55 16 3209 1313



TARIM İLAÇLARI SANAYİ ve TİCARET AŞ
Cumhuriyet Bul. No: 280/101 Alsancak / İZMİR
Tel: (0.232) 464 23 85 • Faks: (0.232) 464 23 95
Kordon V.D. 394 045 6805

Feride YİĞİT
Teknik Müdür

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

21 Şubat 2019

