İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 19.11.2014 / 9922

KULLANILACAĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma	**Karaleke** (*Venturia inaequalis*)	15 ml / 100 L su	35 gün
Patates	**Kökboğazı Nekrozu ve Siyah Siğil Hastalığı** (*Rhizoctonia solani*)	20 ml / 100 kg tohum	-
Bağ*	**Külleme** (*Erysiphe necator*)	15 ml / 100 L su	28 gün
Kayısı	**Çiçek Monilyası** (*Monilinia laxa*)	25 ml / 100 L su	21 gün
Kiraz/Vişne	**Çiçek Monilyası** (*Monilinia laxa*)	30 ml / 100 L su	14 gün
Şeftali	**Çiçek Monilyası** (*Monilinia laxa*)	30 ml / 100 L su	21 gün
Şeftali	**Külleme** (*Sphaerotheca pannosa* var. *persicae*)	15 ml / 100 L su	21 gün

*** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.**

Fluxapyroxad; spor çimlenmesini, çimlenme tüpü oluşumunu, misel gelişimini ve spor oluşumunu engelleyerek önleyici ve tedavi edici etki göstermektedir. İlaçlamadan hemen sonra bitki içerisine girer ve diğer bölümlere hızla taşınarak uygulamadan 2 saat sonra yağacak olan yağmurdan etkilenmez ve iyi bir rezidüel koruma sağlar.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

Tohum uygulaması için: Tohumluk patates düz bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ürün miktarı bir kova içindeki 1-2 L suya ilave edilip iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım tohumluk patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonra kalan yarısı püskürtülerek uygulama tamamlanır. Uygulamada dikkat edilecek husus, su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. Uygulamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi, tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. Uygulama, çuvallama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.

02 Şubat 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Sercadis®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C2:7	Fungisit (Mantar ilacı)

300 g/L Fluxapyroxad

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- **Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının 1/4 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, gözde tahriş, ciltte alerjik reaksiyon ile tahrişe neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.
Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.
Solunması halinde; Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.
Deri ile temas ederse; su ve sabun ile yıkayın.
Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın.
Yutulması halinde; derhal ağzı su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurun. Maruz kalınırsa ya da temas edilirse: Zehir Merkezini veya doktoru arayın.

Dr. Nesen BAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER
Fluxapyroxad

ZARARLILIK İŞARETİ

UYARI KELİMESİ
Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ
H362 Anne sütü ile beslenen çocuklara zarar verebilir.
H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.
EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P202 Güvenlikle ilgili önlemlerin tamamı okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P260 Toz veya dumanları solumayınız.
P263 Hamilelik/emzirme süresince temastan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın
P391 Döküntüyü bir araya toplayın.
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

Dr. A. Sibel VELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No. 0143002384900015 Sicil No. 103411
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey
C Kapısı No: 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 143 002 3849

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinesinin Temizliği
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
Elma Karalekesi:
1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.
Patateste Kökboğazı Nekrozu ve Siyah Sigil Hastalığı: Sıvı ilaçlama düzeneğine sahip selektörlerle de uygulama yapılabilir. İdeal su miktarı tohumu iyi bir şekilde kaplayan fakat akmayan miktardır. Kalibrasyon yaptıktan sonra gerekli miktar ürün, gerekli miktar su ile iyice karıştırılır. İlaçlama düzeneğinin deposuna konarak uygulama yapılır. Uygulamadan sonra çuvallanacak olan ilaçlı tohumun tamamen kurumuş olduğundan emin olunmalıdır.
Bağ küllemesi:
1. uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra tanelerin ben düşme dönemine kadar 10-14 gün aralıklarla devam edilir.
Kayısı, Kiraz/Vişne ve Şeftalide çiçek monilyası:
1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin %5-10'u açtığında)
2. uygulama: Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.
Şeftali küllemesi:
1. uygulama: Önceki yıllardaki hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %3' ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca) ilk uygulama yapılmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar bitkinin gelişmesi ve uygulanan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla yapılır.

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜNÜ İYİCE ÇALKALAYINIZ.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
02 Şubat 2022

Sercadis®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C2:7	Fungisit (Mantar ilacı)

300 g/L Fluxapyroxad

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

® BASF firmasının tescilli markasıdır.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÜRETİCİ FİRMA
BASF SE Carl-Bosch-Strasse: 38
67056 Ludwigshafen, Almanya

ÜRETİM TESİSİ
BASF Espanola S.L Carretera N-340 km 1.156
43006 Tarragona / İspanya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı
No:3e/ 5-22 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Dr. A. Sibel YELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No. 0143002384900015 Sicil No. 103411
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey
C Kapısı No: 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 143 002 3849

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ
Sercadis® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Sercadis® 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Eğer diğer bitki koruma ürünleri ile bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

BASF
We create chemistry

Sercadis®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	**C2:7**	**Fungisit (Mantar ilacı)**

300 g/L Fluxapyroxad

Dr. A. Sibel VELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No. 0143002384900015 Sicil No. 103411
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey
C Kapısı No: 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 143 002 3849

Dr. Nesrin ÇAKIR ARMAN
Daire Başkanı

T.C. GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
02 Şubat 2022
KEŞİDE EDİLMİŞTİR