

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarih ve Numarası: 05.06.2017 / 10903

#### KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu
Bağ	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	50 g/ 100 L su
Çilek (Tarla ve sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	50 g/da
Domates (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	50 g/da
Marul	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	50 g/da

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakine ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

##### Bağ kurşuni küf;

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;

- ilaçlama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,
- ve diğer ilaçlamalar: 7-10 gün aralıklarla 2-3 ilaçlama yapılır. Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde;
- ilaçlama: Çiçeklenmeden hemen önce,
- ilaçlama: Kapalı salkıım döneminde,
- ve diğer ilaçlamalar: 7-10 gün aralıklarla 2-3 ilaçlama yapılır.

##### Çilek Kurşuni Küf (Tarla/sera):

- ilaçlama: İlk çiçeklerin % 10'u açınca,
- ilaçlama: Çiçeklerin %50'si açınca,
- ilaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.



# Serifel®

## Suda Islanabilir Toz (WP)

Grubu	F6: 44	Biyolojik Fungisit (Mantar ilacı)
-------	--------	--------------------------------------

*Bacillus amyloliquefaciens* MBI 600 ırkı >5.5x10<sup>10</sup> cfu/g

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Aşırı solunması halinde zararlı olabilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

**Solunursa;** hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın.

**Deri ile temas ederse;** su ve sabun ile iyice yıkayın.

**Göz ile temas ederse;** derhal etkilenen gözü gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın.

**Yutulursa;** ağzı su ile çalkalayın ve sonra bol su için.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Net Miktarı : 0.5 kg E  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

1/2

#### İÇİNDEKİLER

*Bacillus amyloliquefaciens* MBI 600 ırkı

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ

Bu ürün için zararlılık işaretine gerek yoktur.

#### UYARI KELİMESİ

Bu ürün için uyarı kelimesine gerek yoktur.

#### ÖNLEM İFADELERİ

- P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.
- P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz
- EUH212 Dikkat! Kullanıldığında tehlikeli tozlar oluşabilir. Tozunu solumayın.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Hazırlar hazırlamaz hemen kullanınız.
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız.
- Ambalajı direkt güneşten koruyunuz. Donmaya karşı korunaklı şekilde depolayınız. 5 °C'nin altındaki ve 25 °C 'nin üstündeki sıcaklıklarda saklamayınız.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesi firmamızın garantisini altındadır. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul edilmez.

Dr.A. Sibel Ü. İOĞLU  
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic.Ltd.Şti.

Mersis No: 0143002384900015 Sicil No: 103411  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey  
C Kapısı No: 3/E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

07 Mart 2022

**Domates Kurşuni Kuf (Sera):** Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir.

**Marul Kurşuni Kuf:** Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Serifel® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F6:44 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Serifel®'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F6:44 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Tek başına kullanılması gerekmektedir.

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



## Serifel®

### Suda Islanabilir Toz (WP)

Grubu	F6: 44	Biyolojik Fungisit (Mantar ilacı)
-------	--------	--------------------------------------

*Bacillus amyloliquefaciens* MBI 600 ırkı >5.5x10<sup>10</sup> cfu/g

#### ÜRETİCİ FIRMA

BASF Corporation  
North America Regional Headquarters 100 Park Avenue  
Florham Park, New Jersey 07932, ABD

#### ÜRETİM YERİ

BASF Corporation  
801 Dayton Avenue, St. Ames, Iowa, 50010, ABD

#### RUHSAT SAHİBİ FIRMA

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir  
Kuzey C Kapısı No:3e/5- 22 Ataşehir/İstanbul  
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

  
Dr.A. Sibel VELİOĞLU  
Ruhsatlandırma Müdürü

**BASF Türk Kimya San. ve Tic.Ltd.Şti.**

Mersis No: 0143002384900015 Sicil No: 103411  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey  
C Kapısı No: 3/E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

07 Mart 2022  
KARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
OTD TEKONROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

