



We create chemistry

Tocata®TR

Hastalıkları bıçak gibi keser!


Kök, kökboğazı çürüklüğü ve yaprak hastalıklarına karşı üstün etki, uzun süreli koruma.

0.232 241 12 50

www.agro.basf.com.tr

BASF Tarım Çözümleri

BASF Tarım Çözümleri





Etkili Madde

42 g/l Epoxiconazole + 150 g/l Prochloraz



Formülasyon Şekli

DC (Suda dağılılabilen konsantre)



Etki Mekanizması

Koruyucu ve tedavi edici özellikte sistemik etkili bir fungusittir. Suda dağılılabilen konsantre (DC) özelliği sayesinde özellikle erken dönemde bitki tarafından çok daha iyi alınabilmektedir. Bitki içerisinde yayılımı çok hızlı ve homojendir. Bu nedenle de özellikle kök, kök boğazı ve yaprak hastalıklarına karşı uzun süreli koruma özelliğine sahiptir.




Özellikleri

- Hem koruyucu hem de tedavi edici özelliktedir.
- Bitki içerisinde uzun süreli kalıcı etkiye sahiptir, bu nedenle uzun süreli koruma sağlar ve hastalıkla mücadelede ilaçlama sayısını azaltır.
- Geniş etki spektrumu sayesinde kök çürüklüğü, kök boğazı çürüklüğü ve yaprak hastalıklarına karşı mükemmel etkilidir.
- Sistemik olarak hızla bitki bünyesine girerek daha önce oluşmuş olan hastalık yapılarını bertaraf eder. Uygulamadan 2 saat sonra yağacak yağmurdan bile etkilenmez.
- Güçlü sistemik etkiye sahip iki farklı maddenin mükemmel birleşimidir. Bu sebeple fungusların dayanıklılık ve bağışıklık kazanma riskini de ortadan kaldırır.
- Yüksek verim ve daha kaliteli ürün alınmasına yardımcı olur.
- Önerilen dozlarda bitkide fitotoksisite riski yoktur.




Yaprak yüzeyine tutunan ve yayılan üstün formülasyon teknolojisi


Su damlacığı



Zayıf tutunma




Standart bir formülasyon



Standart tutunma



Tocata®TR formülasyonu




Mükemmel tutunma ve yayılım



Kullanma Zamanı ve Şekli



- Buğday ve Arpa hastalıklarına karşı kardeşlenme dönemi ortasından (BBCH 25) itibaren, yaprak hastalıklarına karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
- Tocata® TR** önerilen dozda kullanıldığında en az 30 gün süreyle koruyuculuk sağlamaktadır. Uygulamadan 30 gün sonra hastalık koşulları devam ediyorsa ikinci bir uygulama yapılabilir.



Daha yüksek verim ve kalite sağlanması için en ideal kullanım zamanı kardeşlenme dönemi ortası ile bayrak yaprak oluşum dönemi arasındaki zamandır.

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar



Bitki adı	Zararlı organizma adı	Kullanım dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Buğday	Tahıl Küllemesi (<i>Erysiphe graminis</i> f.sp. <i>tritici</i>)	200 ml/da	56 gün
Buğday	Tahıl Fide Yanıklığı, Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (<i>Fusarium culmorum</i>) (<i>Rhizoctonia cerealis</i>)	200 ml/da	56 gün
Buğday	Septorya Yaprak Lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	200 ml/da	56 gün
Çeltik	Çeltik Yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	200 ml/da	56 gün
Arpa	Tahıl Fide Yanıklığı, Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (<i>Fusarium culmorum</i>) (<i>Rhizoctonia cerealis</i>)	200 ml/da	56 gün

Karışabilirlik Durumu



Birçok herbisit, fungusit ve insektisit ile karıştırılarak kullanılabilir. Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir. **Arrat®** ve **Fastac®** ile karıştırılarak uygulanabilir.



Septoria



Kök ve Kökboğazı
Çürüklüğü



Külleme



Çeltik Yaprak
Yanıklığı



BASF Tarım Çözümleri Türkiye Merkez

Bayraklı Tower, Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No: 81/22, 35030 Bayraklı / İzmir

Detaylı Bilgi İçin:

☎ 0,232 241 12 50



www.agro.basf.com.tr



BASF Tarım Çözümleri



BASF Tarım Çözümleri

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.

® = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.
Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.