

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 18.04.2000 / 3750

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

| BİTKİ VEYA KULLANIM ALANININ ADI | KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR | KULLANIM DOZU |
|----------------------------------|--|---|
| SOĞAN | Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) - Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Adana pancarı (<i>Beta adanensis</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Yabancı Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi |
| PAMUK | Yeşil horozibiği (<i>Amaranthus viridis</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yabancı jüt (<i>Corchorus olitorius</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Hanımöşgeği (<i>Euphorbia postrata</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yabancı semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kirpi darı (<i>Setaria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) | 300 ml/da Ekim öncesi |
| AYÇİÇEĞİ | Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yatik sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi |
| MISIR | Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Dikenli eşek marulu (<i>Sonchus asper</i>) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi |



Stomp® Extra

Kapsül Süspansiyon (CS)

| Grubu | K1 | Herbisit (Yabancı ot ilacı) |
|-------|----|-----------------------------|
|-------|----|-----------------------------|

450 g/l Pendimethalin

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, göz ve ciltte tahriş.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlenmesini sağlayın, tıbbi yardım isteyin.
Deri ile temas ederse; bol suyla iyice yıkayın, cilt tahrişi, kaşıntı/kızarıklık olursa Zehir Merkezi'ni ya da doktoru arayın.

Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yutulursa; derhal ağzı su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurun.

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER: Pendimethalin

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ:
DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P261 Tozunu/isini/gazını/dumanını/buharını/serpintisini, solumaktan kaçının.
- P272 Kontamine olmuş giysilerin çalışma alanı dışına çıkmasına izin verilmemelidir.
- P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:


- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Uygulamadan sonra makinayı temizleyiniz.
- Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
- Tavsiye edilen ekim derinliklerine titizlikle uyulmalıdır.
- BKÜ'den en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır.
- % 10 dan fazla organik madde içeren topraklarda ot kontrolünde azalma olabilir. Kumlu topraklarda kullanılmamalıdır.
- Uygulama düzgün yapılmamışsa yabancıot kontrolünü azaltır veya bitkiye zarar verir.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Su göllenen yerlerde kullanılmamalıdır.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Dr.A. Sibel YELIOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No: 103411
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey
C Kapısı: No 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL
E-posta: Muxel@bafsa.com.tr 143 002 3545

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
18 Ocak 2019



| | | |
|----------------|--|---|
| FASULYE | Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Isırgan Otu (<i>Urtica urens</i>) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi |
| TÜTÜN | Sürünücü horozibiği (<i>Amaranthus blitoides</i>) Dar yapraklı horozibiği (<i>Amaranthus graecizans</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) | 300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce, dikim öncesi |
| HAVUÇ | Sürünücü horozibiği (<i>Amaranthus blitoides</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi |

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Soğan: Stomp® Extra, iyi hazırlanmış keseklerden, yabancıotlardan ve daha önce ekilmiş bitkilerin artıklarından temizlenmiş olan toprağa, soğan ekiminden sonra çıkış öncesi uygulanır.

Pamuk: Stomp® Extra, ekim öncesinde tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra hemen veya en geç 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırmaya gerek yoktur.

Havuç, ayçiçeği, fasulye, mısır: Stomp® Extra, ekimden hemen sonra yabancıotlar çıkış yapmadan (çıkış öncesi) uygulanmalıdır.

Tütün: Stomp® Extra, tütün dikiminden hemen önce yabancıotlar çıkış yapmadan (dikim öncesi) uygulanmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

18 Nisan 2019

**Stomp® Extra****Kapsül Süspansiyon (CS)**

| | | |
|--------------|-----------|--|
| Grubu | K1 | Herbisit (Yabancı ot ilacı) |
|--------------|-----------|--|

450 g/l Pendimethalin**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

® BASF firmasının tescilli markasıdır.

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekilde, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch
8088 Pfaffikon – İsviçre

ÜRETİM YERİ:

BASF Agri-Production S.A.S.
Port 7502, 7502 Route du Vieux Chemin de Loon
F59820 Gravelines, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı
No:3e/ 5-22, Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779



[Signature]
Dr.A. Sibe WELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No. 0143002384900015 Sicil No. 103411
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey
C Kapısı No. 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Müktefeler V.D. 143 002 3549

[Handwritten initials]

Kurak şartlarda STOMP® EXTRA uygulamasını takip eden 3-7 gün içerisinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

Münavebe Bitkileri:

Hemen ekilebilecek bitkiler; Pamuk, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler. 6 ay sonra diğer bitkiler ekilebilir.

Uygulama yapılmış tarlanın herhangi bir nedenle bozulması halinde:

Toprak 15 cm işlenerek: Buğday, arpa, pamuk, patates, fasulye, soya ve bezelye

Toprak işlenmeden: Mısır, fasulye ve bezelye ekilebilir.

Fitotoksite: Stomp® Extra hastalık, kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde fitotoksite yapabilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Stomp® Extra adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Stomp® Extra'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmıyınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma ihtiyaç duyulursa, ayrı bir kaptan önce karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.



Stomp® Extra

Kapsül Süspansiyon (CS)

| Grubu | K1 | Herbisit (Yabancı ot ilacı) |
|-------|----|--------------------------------|
|-------|----|--------------------------------|

450 g/l Pendimethalin

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
18 Nisan 2019



Dr.A. Sibel MELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No. 0143002384900015 Sicil No. 103411
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey
C Kapısı No. 3E 5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 143 002 3849