

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 11.11.2015 / 10398



Insure® Perform

Net Miktarı : 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Triticonazole; Pyraclostrobin

ZARARLILIK İŞARETİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

- H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.
EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

- P102 Çocukların ulaşmayacakları yerde tutun.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu kullanın.
P391 Döküntüyü bir araya toplayın.
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- İlaçlanmış tohumlar, gıda ve hayvan yemi olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) depolarda ve kendi ambalajında açılmadan saklandığında üç yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

Dr.A. Sibel VELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçeriköy Mah. Bahçeleraşısı Sokak
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 43 34752 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0 216 570 34 00, Fax: 0 216 570 37 79
Ticari Sicil No / Registration no: 103411
www.basf.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu
Buğday	Buğday sürme hastalıkları (<i>Tilletia foetida</i> , <i>Tilletia caries</i>)	50 ml / 100 kg tohum
Buğday	Buğday راستی (<i>Ustilago nuda</i> f.sp. <i>tritici</i>)	50 ml / 100 kg tohum
Buğday	Buğdayda kök ve kökboğazı çürüklüğü (<i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	50 ml / 100 kg tohum
Arpa	Arpa kapalı راستی (<i>Ustilago hordei</i>)	50 ml / 100 kg tohum
Arpa	Arpa çizgi yaprak lekesi (<i>Pyrenophora graminea</i>)	50 ml / 100 kg tohum
Arpa	Arpada kök ve kökboğazı çürüklüğü (<i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	50 ml / 100 kg tohum

Insure® Perform, Triticonazole ve Pyraclostrobin aktif maddelerini içeren koruyucu ve tedavi edici özellikte sistemik etkili bir fungusittir. Triazol grubundan Triticonazole; tohum, tohum zarı ve kökler tarafında absorbe edilerek hastalık etmeninin çimlenmesini, haustorya oluşumunu ve hücre çeperlerinde sterol biyosentezini engeller. Strobilurin grubundan Pyraclostrobin ise, mantarların solunum mekanizmasını etkileyerek kontrol etmekte, enerji destek birimlerini bloke ederek büyüme ve gelişmeyi durdurmakta, spor çimlenmesini, çimlenme tüpünün büyümesini ve sekonder enfeksiyon oluşumunu engellemektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

Tohum ilaçlaması şeklinde kullanılır. 100 kg tohumu ilaçlamak için gerekli miktardaki ilaç bir kap içerisinde 1,5 litre su ile iyi bir şekilde karıştırılır. Bu karışım düz ve temiz bir zemin üzerine konulmuş tohum üzerine yavaş yavaş akıtılarak bir taraftan da kürekle karıştırılır. Karıştırma işlemine tüm tohumlar homojen bir şekilde ilaçla kaplanıncaya kadar devam edilir.

İlaçlama varil (kaskat) ile ilaçlama yapılacak ise; 100 kg tohum için, gerekli miktardaki ilaç bir kap içerisinde 1,5 litre su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada ilaçlama variline ilave edilir. Her defasında ilaçlama varil çevrilerek tohumların homojen bir şekilde ilaçla kaplanması sağlanır.

Sıvı ilaçlama tertibatı olan selektörlerde ise; bir ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde ilaçlanmasını sağlayacak su miktarı bulunur (bu miktar ilaçlama ekipmanına göre 100 kg tohum için 500 ml - 800 ml arasında değişebilir).

16 Mart 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSAL ZEHİR MERKEZİ

FS (Tohum ilaçlaması için akıcı konsantre)

Grubu	G1:3	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------	----------------------------

AKTİF MADDENİN ADI VE MİKTARI:
80 g/l Triticonazole + 40 g/l Pyraclostrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının 1/4 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Alerjik reaksiyona neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın.

Deri ile temas ederse; su ve sabun ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın.

Yutulursa; derhal ağız su ile çalkalayın ve sonra bol su için, kusmaya çalışın, tıbbi yardım isteyin.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Tüm ilaçlama uygulamaları için; ideal su miktarı, tüm tohumları iyi bir şekilde kaplayan fakat akmayan miktardır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Insure® Perform adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3;C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Insure® Perform'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3;C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kaptaki ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

® BASF firmasının tescilli markasıdır.



Insure® Perform

FS (Tohum ilaçlaması için akıcı konsantre)

Grubu	G1:3	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------	----------------------------

AKTİF MADDENİN ADI VE MİKTARI:
80 g/l Triticonazole + 40 g/l Pyraclostrobin

ÜRETİCİ FİRMA

BASF Agri-Production S A S, Rue Jacquard Z.I. Lyon Nord
69727 Genay Cedex - B.P. 73 / Fransa

RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete Plaza No: 43
34752 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779


Dr. A. Sibel VELİOĞLU
Ruhsatlandırma Müdürü

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sokak
Plaza No: 43 34752 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 570 34 00, Fax: 0216 570 37 79
Ticaret Sicil No / Registration no: 103411
www.basf.com.tr

16 Mart 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
KARLI ERİM MÜHÜRÜ

