



Bağ Mildiyösu
(Plasmopara viticola)



Domates Mildiyösu
(Phytophthora infestans)



Soğan Mildiyösu
(Peronospora destructor)



Mildiyö "Mavi Küf"
(Peronospora tabacina)



Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)



BASF Agro Genel Merkez Limburgerhof - ALMANYA

Adana Ofis

Turgut Özal Bulvarı, Güzelyalı Mahallesi, 81151 Sok.
Yeşilköşe Sitesi A Blok Kat: 3 Daire: 5 Seyhan 01170 ADANA
Tel : (0322) 235 02 53
Faks : (0322) 235 09 59
GSM : (0532) 331 24 32

Ankara Ofis

Oğuzlar Mahallesi, Ceyhan Atif Kansu Cad. 48. Sok.
Can İş Merkezi, No: 5/2 Balgat / Çankaya 06520 ANKARA
Tel : (0312) 285 39 07
Faks : (0312) 285 06 14
GSM : (0533) 286 35 45

Antalya İrtibat (Mobil)

GSM : (0530) 605 66 62

Bursa Ofis

Kükürtlü Cad. Tan İş Merkezi, C Blok
Kat: 4 Daire: 12 Osangazi 16080 BURSA
Tel : (0224) 232 32 63
Faks : (0224) 232 32 75
GSM : (0532) 296 13 02

Diyarbakır Ofis

Şanlıurfa Yolu 1. km Gündoğan Plaza No: 3 21100 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 252 02 89
Faks : (0412) 228 55 81

İstanbul Ofis

Mete Plaza Değirmenyolu Cad. Huzurhoca Sk. No: 84
İçerenköy / Ataşehir 34752 İSTANBUL
Tel : (0216) 570 34 00
Faks : (0212) 570 36 33

İzmir Ofis

Hürriyet Bulvarı No: 18 Münir Birsal Plaza 2,
B Blok Kat: 7 Daire: 13-14-15 Çankaya 35230 İZMİR
Tel : (0232) 445 00 69
Faks : (0232) 441 12 82
GSM : (0533) 277 37 14

Tekirdağ İrtibat (Mobil)

GSM : (0530) 605 66 61

ACROBAT®

"Farklı, güvenilir çözüm" Plus

hiyarda
bekleme süresi
3 gün



Üretici Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen - Almanya

Ruhsat Sahibi ve Pazarlayıcısı
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hürriyet Bulvarı No: 18 Münir Birsal Plaza 2,
B Blok Kat: 7 Daire: 13-14-15 35230 Çankaya / İzmir
Tel : (0232) 445 00 69 pbx
Faks : (0232) 441 12 82
www.agro.basf.com.tr

24 SAAT
ULUSAL ZEHİR MERKEZİ
(UZEM)
114

Ronin-04/2010

Sebzede mildiyö
hastalıklarının kontrolünde
farklı, güvenilir çözüm!

BASF
The Chemical Company

ETKİLİ MADDE

%9 Dimethomorph + %60 Mancozeb

FORMÜLASYON ŞEKLİ

WG (Suda dağılabilen granül)

ETKİ ŞEKLİ

ACROBAT® Plus, Hastalık etmeninin hücre duvarlarını tahrip etmek suretiyle fungusun ölümüne neden olur.

ÖZELLİKLER

- Lokal Sistemik ve Kontakt etkili (Çift Etki) mildiyö hastalığının erken dönemlerine karşı tedavi edici etkisi vardır.
- Yeni ve farklı etki şekli ile mildiyö hastalıklarıyla mücadelede bizi güvenli kılar.
- İçerdiği Dimethomorph aktif maddesi sayesinde yeni mildiyö ırklarıyla mücadelesinde kesin sonuç alınır.
- Fungusun hayat çemberinde tüm dönemlerde etkilidir.
- Güçlü Antisporulant etkisi sayesinde
- Yüksek Translaminar etkilidir.
- Uygulamadan 2 saat sonra yağın yağmurdan etkilenmez.
- Çevreye, arılara ve diğer faydalı böceklere zararsızdır.
- IPM (Entegre Mücadele)'e uygundur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

İLACIN HAZIRLANIŞI

Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

RUHSATLI OLDUĞU KÜLTÜR BİTKİLERİ ve HASTALIKLAR

Bitki	Hastalık Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ	Bağ Mildiyösü (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 g / 100 l su	28 gün
Domates	Domates Mildiyösü (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g / 100 l su	7 gün
Hıyar (Tarla ve Sera)	Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200 g / 100 l su	3 gün
Patates	Patates Mildiyösü (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g / da	7 gün
Soğan	Soğan Mildiyösü (<i>Peronospora destructor</i>)	200 g / 100 l su	7 gün
Tütün	Mildiyö "Mavi Küf" (<i>Peronospora tabacina</i>)	100 g / 100 l su	28 gün

KULLANMA ZAMANI ve ŞEKLİ**Bağ Mildiyösü:**

1. ilaçlama, sürgünler 25-30 cm boya erişince yapılmalıdır.
2. ve daha sonraki ilaçlamalar 10 günlük aralıklarla yapılmalıdır.

Patates, Soğan, Domates ve Hıyarda Mildiyö:

İlaçlamaya bitkilerde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalı, hava koşulları ve bitkinin gelişme durumuna göre 10 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Tütünde Mildiyö:

Tohumların çimlenip, fidelerin toprak yüzünü örtmesinden sonra başlanarak 8-10 arayla ilaçlanır.

TOKSİSİTESİ

Siçanlarda akut ağızdan LD₅₀ = 3500 mg/kg

RUHSAT TARİHİ ve NO

07.10.2009 / 7235