

# Basagran®

**Çözüm**

Yeniliklerimizi  
[www.agro.basf.com.tr](http://www.agro.basf.com.tr)  
adresinden takip edebilirsiniz.

**Yine Ustasından**



Soya, bezelye, soğan ve fasulyede yabancı otlara karşı kontakt etkili herbisit.

**BASF**  
The Chemical Company



Domuz pıtrağı  
(*Xanthium strumarium*)



Horoz ibiği  
(*Amaranthus retroflexus*)



Yapışkan otu  
(*Galium aparine*)



Yabani hardal  
(*Sinapis arvensis*)



Çoban çantası  
(*Capsella bursapastoris*)

**ETKİLİ MADDE** : 480 gr/lit Bentazon  
**FORMÜLASYON ŞEKLİ** : SL (Suda Çözünebilir Konsantre)

### KULLANILDIĞI BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

Bitki adı	Yabancı otlar	Kullanım dozu ve dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Soya	Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ), Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Horoz ibiği ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ), Sütleğen ( <i>Euphorbia prostrata</i> ) Yapışkan otu ( <i>Galium aparine</i> ), Topalak ( <i>Cyperus rotundus</i> )	150 ml/da Soya 1-3 yapraklı, yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde	30 gün
Bezelye	Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ), Çoban çantası ( <i>Capsella bursapastoris</i> ) Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> ), Kuşotu ( <i>Stellaria media</i> )	200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde	30 gün
Soğan	Horoz ibiği ( <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>A. lividus</i> ), Yoğurt otu ( <i>Galium tricornutum</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ), Kuşotu ( <i>Stellaria media</i> ) Tatula ( <i>Datura stromonium</i> ), Çoban çantası ( <i>Capsella bursapastoris</i> ) Kangal ( <i>Silybum marianum</i> ), Eşek marulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> )	200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı döneminde	30 gün
Fasulye	Horoz ibiği ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	200 ml/da	30 gün
	Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	200 ml/da	
	Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	250 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde	

**Basagran®'dan daha etkili sonuç almak için yabancı otların erken döneminde kullanılması önemle tavsiye edilir.**

**İLACIN HAZIRLANMASI ve KULLANILIŞI:** İlaçlama deposuna yarıya kadar su konur, üzerine lüzumlu miktarda **Basagran®** dökülür ve karıştırılarak su ile depo doldurulur.

**Basagran®** çıkış sonrası kullanılan bir yabancı ot ilacı olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancı otların erken çıkış dönemlerinde yapılır. Şayet yabancı otlar uygulama esnasında 4 yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da'ya çıkarılmalıdır.

Ballıbaba  
(*Lamium amplexicaule*)



Kuşotu  
(*Stellaria media*)



Yoğurt otu  
(*Galium tricornutum*)



Tatula  
(*Datura stromonium*)



Kangal  
(*Silybum marianum*)



Eşek marulu  
(*Sonchus oleraceus*)



#### Üretici Firma:

BASF SE  
67056 Ludwigshafen - Almanya

#### Ruhsat Sahibi ve Pazarlayıcısı

**BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
Hürriyet Bulvarı No: 18 Münir Birsal Plaza 2,  
B Blok Kat: 7 Daire: 13-14-15 35230 Çankaya / İZMİR  
Tel : (0232) 445 00 69 pbx  
Faks : (0232) 441 12 82  
Web : www.agro.basf.com.tr

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. bir ZİMİD üyesidir.

24 SAAT

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ  
(UZEM)  
114

**Basagran®**  
Çözüm Yine Ustasından