



**İLACI KULLANMADAN ÖNCE AMBALAJ ETİKETİNİ MUTLAKA OKUYUNUZ !**

**Adana Ofis**

Yeşilyurt Mah. İbo Osman Cad. 65 Sk.  
Hasgöl Apt. Zemin Kat No: 1 Seyhan / ADANA  
Tel : (0322) 227 77 36 - 227 71 85  
Faks : (0322) 227 69 41

**Ankara Ofis**

Çetin Emeç Bulvarı No: 41/11 Çankaya / ANKARA  
Tel : (0312) 480 19 12 - 480 19 14  
Faks : (0312) 480 19 24

**Antalya İrtibat (Mobil)**

GSM: (0532) 282 02 24

**Bursa İrtibat (Mobil)**

GSM: (0532) 296 13 02

**İstanbul Ofis**

Defterdar Yokuşu No: 3 Tophane 34425 İSTANBUL  
Tel : (0212) 334 34 00  
Faks : (0212) 334 34 99



BASF Agro Genel Merkez Limburgerhof-ALMANYA

**Candit® WG**

*“Farklı ve Güçlü”*



150g kutu  
ambalajında

T I A T A N I T I M 0212-281 0435 CANDIT WG 04/2007-BM01

**Candit® WG**

*“Farklı ve Güçlü”*



(24 SAAT) 114 ULUSAL ZEHİR  
MERKEZİ (UZEM)

**ÜRETİCİ FIRMA**

BASF Aktiengesellschaft  
67056 Ludwigshafen  
Almanya

**RUHSAT SAHİBİ VE PAZARLAYICISI**

**BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.**

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49 Penpar İşhanı, Kat 6 / 603 Çankaya 35210 İZMİR

Tel : (0232) 489 30 97 - 441 10 47

Fax: (0232) 441 12 82

**BASF**

The Chemical Company

# Candit® WG

ETKİ ŞEKLİ :

ÇİFT ETKİLİ  
Koruyucu  
Tedavi Edici

Hücrede, solunum sistemini kesintiye uğratarak fungusun ölümüne neden olur.

ETKİN MADDE: %50 Kresoxim-Methyl

TOKSİSİTE : Ağız yoluyla LD<sub>50</sub>:>5000 mg/kg

## ÖZELLİKLER

- Quasi-sistemik
- Çiçek döneminde kullanılabilir
- Arılara zehirsiz
- Farklı bir etkili madde
- Güçlü antispörolant etki
- Bitkide yeşil bir görünüm sağlar
- Yağışlarla yıkanmaz
- Lekesiz ve kaliteli ürünler
- IPM'e uygun
- Çevreye saygılı

Quasi-Sistemik

Doğadan gelen güç!..



Strobilurus tenacellus



## Genel Olarak Karaleke İlaçlama Zamanı:

### 1. İlaçlama

Çiçek gözleri kabardığında,

### 2. İlaçlama

Pembe tomurcuk devresinde,

### 3. İlaçlama

Çiçek taç yapraklarının %70-80'i döküldüğünde, hava koşullarına göre ilaçlamalara 10-14 gün aralıklarla devam edilir.

## Kullanım Alanı

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANIM DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE (GÜN)
Elma	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	15 g/100 lt. su	35 gün
Bağ	Bağ külleme ( <i>Uncinula necator</i> )	20 g/100 lt. su	35 gün
Kabakgiller (Hıyar, kabak, kavun, karpuz)	Külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> / <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	25 g/100 lt. su	4 gün
Narenciye	Alternaria yanıklığı ( <i>Alternaria citri</i> )	25 g/100 lt. su	14 gün

Yaprakta karaleke



Meyvede karaleke



Bağ küllemesi



Yaprakta karaleke



Bağ küllemesi



Salatalıkta külleme



## Karalekenin Gelişme Safhaları

