



**Collis®**  
İYİDEN MÜKEMMELE...

**BASF**  
We create chemistry

**İyiden Mükemmele...**

**ETKİLİ MADDE:** 100 gr/lit Kresoxim-methyl + 200 gr/lit Boscalid


**FORMÜLASYON ŞEKLİ:** SC (Süspansiyon konsantre)

## ETKİ ŞEKLİ:

Lokal ve quasi sistemik etkili bir fungusittir. İçerdiği farklı etkili maddeler sayesinde direnç yönetimi açısından uygundur.

## ÖZELLİKLERİ:

- Külleme hastalıklarına karşı üstün etkiye sahip yepyeni bir fungusittir.
- Farklı etki mekanizmasına sahip iki etkili madde içerir. Bu sayede direnç yönetimi açısından bizi güvenli kılar.
- Daha kaliteli ürün alınmasını sağlar.
- Yağmurda yıkanmaz. İlaçlamadan 2 saat sonra yağın yağmurdan etkilenmez.
- Arılara zehirsizdir.
- IPM'ye (Entegre mücadele) uygundur.



Boscalid ve Kresoxim-Methyl'in bitkiye alınma şekli



**Bağ küllemesi**  
(*Uncinula necator*)



**Biber küllemesi**  
(*Leveillula taurica*)



**Kavun küllemesi**  
(*Sphaerotheca fuliginea*)

## KULLANMA ZAMANI ve ŞEKLİ:

### Bağda külleme:

1. İlaçlama: Çiçek öncesi sürgünler 25-30 cm boya erişince,
2. İlaçlama: Koruklar saçma tanesi iriliğini aldığı anda yapılmalıdır.

Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 3. ve diğer ilaçlamalara 10-14 gün aralıklarla devam edilir. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamaya son verilmelidir.

**Çeltik Yanıklığı:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine göre 28 gün sonra ilaçlama tekrarlanır.

**Domateste ve Biberde külleme (Serada):** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine göre 28 gün sonra ilaçlama tekrar edilir.

**Kavun Külleme:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

**Şeftali Külleme:** ilk ilaçlama sürgünlerin yaklaşık 20 cm uzunluğa ulaştığı dönemde yapılır. Hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

## KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Acrobat® Plus, Aviso® WG, Alverde®, Polyram®, Fastac® 100 EC ile karıştırılarak kullanılabilir.

Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

## KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ (Üzüm)	Külleme ( <i>Erysiphe necator</i> )	30 ml/ 100 L su	28 gün
Bağ (Yaprak)			14 gün
Domates (Sera)	Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	50 ml/ 100 L su	3 gün
Biber (Sera)	Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	50 ml/ 100 L su	3 gün
Patlıcan (Sera)	Patlıcangillerde Külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	50 ml/ 100 L su	3 gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	50 ml/ 100 L su	3 gün
Kabak	Kabakgillerde külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	50 ml/ 100 L su	3 gün
Kavun	Kabakgillerde külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	50 ml/ da	3 gün
Karpuz	Kabakgillerde külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	50 ml/ 100 L su	3 gün
Şeftali	Külleme ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i> )	30 ml/ 100 L su	7 gün
Çeltik	Çeltik yanıklığı ( <i>Pyricularia oryzae</i> )	100 ml/ da	42 gün
Çilek	Külleme ( <i>Sphaerotheca macularis</i> f.sp. <i>fragariae</i> )	50 ml/ 100 L su	3 gün
Fındık	Külleme ( <i>Erysiphe</i> spp.)	30 ml/ da	14 gün



• **Collis®**



• **Collis®**

#### BASF Bitki Koruma Türkiye Merkez

Bayraklı Tower, Mansurođlu Mah. Ankara Cad. No: 81/22, 35030 Bayraklı / İzmir

Detaylı Bilgi İin:

☎ 0.232 241 12 31

🌐 [www.agro.basf.com.tr](http://www.agro.basf.com.tr)

📘 BASFBitkiKoruma

BASF firması ZİMİD (Zirai Mcadele İlaları reticileri Derneđi) yesidir.

® = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Bitki koruma rnlerini dikkatli kullanın. Kullanmadan nce mutlaka etiketi ve rn bilgilerini okuyun.  
Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata gein.